

46 **Haut.** Schmerzhaftige Ausschläge.

|| Weißer Frieselausschlag (Miliaria) an Brust und Rücken. *θ* Typhus<sup>†</sup>.

|| Haut zu trocken und warm. *θ* Hysterische Neuralgie.

47 **Alter und Konstitution.** Hysterische Frauen, die zuviel Kamillenteegetränken haben.

Nervöse, reizbare, hysterische Personen, bei denen die Verstandestätigkeit vorherrscht und die an hysterischer Neuralgie leiden.

Frau, 24 J. alt, groß, dunkle Haare und Augen, Mutter eines 9 Monate alten Kindes; Krämpfe.

Frau, 50 J. alt; hysterische Sinnestäuschungen (Halluzinationen).

5 Ein Mann, 50 J. alt, von blühender Gesichtsfarbe, fast rotwangig, gewohnheitsmäßig in heiterer Stimmung; Neuralgie der Glieder.

Frau —, von großer Statur, helle Gesichtsfarbe, dunkle Haare und Augen, für gewöhnlich schwach, leidet an nächtlichen Asthmaanfällen; krampfhaftes Asthma.

Eine Person mit hochgradig nervöser und reizbarer Konstitution; Neuralgie.

48 **Verwandtschaften.** Wird antidotiert von: *Bellad.*, *Camphora*, *Cina*, *Coffea*, *Pulsat.*

Es antidotiert: *Mercur.*, Mißbrauch von Kamillenteeg.

Vergleiche: *Arnica.*, *Asafoet.*, *Crocus*, *Dulcam.*, *Hyper.*, *Ignat.*, *Nux vom.*, *Spig.*, *Sulfur* (Krämpfe nach Verletzungen).

## VERATRUM ALBUM

Weißer Nieswurz, weißer Germer

Liliaceae

Untergruppe: Melanthioideae

Die europäische Nieswurz wächst auf feuchten Wiesen in den Alpen und Pyrenäen, in ganz Rußland, Nordchina und Japan.

Die Tinktur wird aus der pulverisierten trockenen Wurzel hergestellt.

Eingeführt von Hahnemann und geprüft an sich selbst, Becher, Franz, Fr. Hahnemann, Stapf, Teuthorn usw., R. A. M. L., Bd. 3; Lembke, N. Z. für H. K., Bd. 7, S. 73; Schelling, A. H. Z., Bd. 83, S. 19.

Toxikologische Berichte sind zahlreich, siehe Allens Enzyklopädie, Bd. 10, S. 73.

KLINISCHE ZEUGNISSE.— *Melancholia* (Schwermut), Dulac, A. J. H. M. M., Bd. 3, S. 56; *Wahnsinn*, Schreter, Woost, Hirsch, Rück. Klin. Erf., Bd. 5, S. 12; Knorre, A. H. Z., Bd. 19; B. J. H., Bd. 12, S. 482; *Insanity* (Geisteskrankheit), Jahr, B. J. H., Bd. 12, S. 468; Jahr, B. J. H., Bd. 12, S. 476; Foote, N. A. J. H., Bd. 22, S. 546; Forst, N. E. M. G., Bd. 8, S. 273; *Geistesstörungen*, Rademacher, Knorre, Kretschmar, Schüler, Rück. Klin. Erf. Bd. 1, S. 52; *Kopfschmerz*, Lobethal, Black, Hrg., Rück. Klin. Erf., Bd. 1, S. 211; Barrows, N. E. M. G., Bd. 4, S. 97; Hoyne, Hom. Ob., Bd. 12, S. 18; *Hirnhautentzündung*, Knorre, Rück. Klin. Erf., Bd. 1, S. 132; *Affection of scalp* (Erkrankung der Kopfhaut), Searle, A. H. O., 1871, S. 33; *Weichselzopf* (*Plica polonica*), Boeck, Rück. Kl. Erf., Bd. 4, S. 319; *Disease of fundus oculi* (Erkrankung des Augenhintergrundes), McGuire, Hah. Mo., Bd. 16, S. 449; *Neuralgie der Lider* (*Neuralgia palpebralis*), Hirsch, A. H. Z.,

Bd. 95, S. 133; *Nasenbluten*, Kreuss, Rück. Kl. Erf., Bd. 1, S. 415; *Gesichtsneuralgie*, Schleicher, Kafka, Rück. Kl. Erf., Bd. 5, S. 195; *Zahnschmerz*, Bönninghausen, Rück. Kl. Erf., Bd. 1, S. 482; H. Welt, Bd. 6, S. 127; *Halserkrankung*, Schelling, Rück. Kl. Erf., Bd. 5, S. 252; *Heißhunger (Bulimie)*, Gross, Rück. Kl. Erf., Bd. 1, S. 553; Altschul, Rück. Kl. Erf., Bd. 5, S. 258; *Erbrechen*, Schreiber, Schmid, Diez, Elwert, Rück. Kl. Erf., Bd. 1, S. 560; *Vomiting of food* (Erbrechen von Essen), Hale, A. J. H. M. M., Bd. 2, S. 266; *Magenstörung*, Wolf, Rück. Kl. Erf., Bd. 1, S. 594; *Disordered stomach* (Verdorbener Magen), Berridge, A. J. H. M. M., Bd. 4, S. 73; *Indigestion* (Verdaunungsschwäche), Bayes, B. J. H., Bd. 30, S. 154; *Gastralgia* (Magenschmerz), Pope, B. J. H., Bd. 12, S. 487; *Gastrodynia* (Magenkrampf), Bayes, Hom. Rev., Bd. 15, S. 15; *Gastritis*, Kreuss, Rück. Kl. Erf., Bd. 1, S. 603; *Bluterbrechen* (Haematemesis), Kreussel, Hartm., Rück. Kl. Erf., Bd. 1, S. 576; *Meteorismus*, Stens, A. H. Z., Bd. 91, S. 189; *Empty feeling in abdomen* (Leeres Gefühl im Bauch), Berridge, Hom. Phys., Bd. 8, S. 553; *Neuralgia of bowels* (Neuralgie der Därme), Kitchen, A. J. H. M. M., Bd. 5, S. 20; *Kolik*, Hahnemann, Gaspary, Rück. Kl. Erf., Bd. 1, S. 763; Lembke, Rück. Kl. Erf., Bd. 5, S. 371; Lembke, N. A. J. H., Bd. 4, S. 343; Stens, B. J. H., Bd. 34, S. 725; *Colicodynia* (Kolikschmerz), Hahnemann, A. J. H. M. M., Bd. 1, S. 85; *Darmeinstülpung* (Intussusception), Ellinger, Rück. Kl. Erf., Bd. 5, S. 376; *Diarrhoe*, Hartlaub, Schmid, Kopp, Rück. Kl. Erf., Bd. 1, S. 851; Kafka, Hofrichter, Rück. Kl. Erf., Bd. 5, S. 435; Brückner, N. A. J. H., Bd. 19, S. 417; Madden, B. J. H., Bd. 28, S. 719; Blake, Hom. Rev., Mai, 1889; Jahr, A. J. H. M. M., Bd. 1, S. 195; Martin, A. J. H. M. M., Bd. 4, S. 148; Lilienthal, H. M. Dec, 1873, S. 214; Berridge, Hom. Phys., Bd. 4, S. 47; *Dysentery* (Ruhr), Munroe, Mass., Trans., Bd. 4, S. 375; *Cholera infantum* (Brechdurchfall der Säuglinge), Jones, Med. Adv., Jan, 1890, S. 23; *Cholera morbus*, Schreiber, Rummel, Schindler, Schreter, Weigel, Tietze, Nehrer, Maly, Rück. Kl. Erf., Bd. 1, S. 891; Schmid, B. J. H., Bd. 5, S. 280; Miller, N. Y. S. Trans., 1875; Miller, Obs., Nov. 1875, S. 418; Holmes, Hom. Phys., Bd. 8, S. 602; *Cholera Asiatica*, Quin, Schreter, Seider, Veith, Rummel, Bernet, Schmid, Roth, Reubel, Lobeth., Vehs, Montagk, Henke, Tietze, Adler, Schweick, Kurtz, Gerstl, Hofrichter, Widman, Schüler, Ruoff, Mabit, Rück. Kl. Erf., Bd. 1, S. 965-975; Engelhard, Findeisen, Rück. Kl. Erf., Bd. 5, S. 486; (6 Fälle), Drysdale, B. J. H., Bd. 8, S. 155; Curtis, N. A. J. H., Bd. 8., S. 16; *Verstopfung* (Constipation), Hartmann, Rück. Kl. Erf., Bd. 1, S. 819; Elwert, Broackes, Bernard and Strong, S. 109; *Dysmenorrhoea and hemeralopia* (Dysmenorrhoe und Hämophthalmus), Raue, A. J. H. M. M., Bd. 1, S. 174; *Menstruationstörung*, Morgan, Herings Analyt. Therap., Bd. 1, S. 181; *Metritis* (Gebärmutterentzündung), Times Ret., 1877, S. 111; *Schwangerschaftsbeschwerden*, Rückert, Rück. Kl. Erf., Bd. 2, S. 387; *Stimmritzenkrampf* (Spasmus glottidis), Ohlhaut, Rück. Kl. Erf., Bd. 3, S. 161. Kafka, Rück. Kl. Erf., Bd. 5, S. 783; *Laryngo-tracheitis* (Kehlkopf-Luftröhrenkatarrh), Mossa, H. Kl. 1870, S. 98; *Asthma*, Hrg, Hartm., Rück. Kl. Erf., Bd. 3, S. 200; *Cough* (Husten), Berridge, A. J. H. M. M., Bd. 4, S. 73; *Cough during measles* (Husten während Masern), Mossa, H. Kl. 1870, S. 98; *Keuchhusten* (Whooping cough), Schmid, Rummel, Gross, Rück. Kl. Erf., Bd. 3, S. 85; Boennighausen, Meyer, Müller, Rück. Kl. Erf., Bd. 5, S. 730; Hirsch, B. J. H., Bd. 25, S. 620; *Distress over heart, etc.* (Quälende Beschwerden über dem Herzen, usw.), Cushing, N. E. M. G., Bd. 14, S. 107; Org., Bd. 2, S. 381; *Myalgia* (Muskelschmerzen), Everett, Hah. Mo., Bd. 10, S. 322; *Coxalgia* (Hüftschmerz), Stens, B. J. H., Bd. 15, S. 131; *Schmerzen in den Armen*, C. M. Rück. Kl. Erf., Bd. 3, S. 59; *Ischias*, Stens, Brückner, Rück. Kl. Erf., Bd. 5, S. 909; *Debility and toothache* (Schwäche und Zahnschmerz), Bönninghausen, Hom. Phys. Bd. 6, S. 373; *Cramps* (Krämpfe), Barton, Mass., Trans, Bd. 4, S. 602; *Chorea*, Copper, B. J. H. Bd. 29, No. 115; *Wechselfieber* (Ague), Bärtl, Rück. Kl. Erf., Bd. 4, S. 998; Watzke, Hom. Jour, Bd. 1, S. 219; Gilchrist, Med. Inv., Bd. 7, S. 99; Pearson, U. S. M. and S. J., Apr. 1866; *Typhus*<sup>1</sup> (Typhoid fever), Kreuss, Schleicher, Wurmb, Schelling, Rück. Kl. Erf., Bd. 4, S. 791; Wurmb and Caspar, B. J. H., Bd. 12, S. 198; Nichols, Hah. Mo. Bd. 16, S. 168; *Gelbfieber*, Taft, Rück. Kl. Erf., Bd. 4, S. 667; *Masern*, Kreuss, Rück. Kl. Erf., Bd. 4, S. 103; *Scharlach*, Kreuss, Rück. Kl. Erf., Bd. 4, S. 67; *Antidote to opium poisoning* (Antidot gegen Opiumvergiftung), Todd, N. E. M. G., Bd. 11, S. 49.

<sup>1</sup> **Geist und Gemüt.** || Ist bei Bewußtsein nur wie im Traum.  
Betäubt von Übermaß an alkoholischen Getränken.

- || Bildet sich ein schwanger zu sein oder daß sie bald entbunden würde; daß sie in Geburtswehen läge<sup>RA(378-380)</sup>.  $\theta$  Hysterischer Wahnsinn.
  - || Irrige und hochmütige Vorstellungen.
- 5 || Sagt nie die Wahrheit; weiß selbst nicht was sie sagt.
- || Sie ist untröstlich über ein eingebildetes Unglück, rennt im Zimmer herum, heult und schreit auf; oder sitzt grübelnd, jammernd und weinend; < am Abend; Schlaf nur bis 2 Uhr nachts.<sup>RA310</sup>
- Wechsel von Lachen und Stöhnen.<sup>RA(383)-</sup>
- Versucht sehr viele Sachen, aber erreicht nichts.
- Wut, mit großer Hitze des Körpers<sup>RA(370)</sup>; ißt seinen eigenen Kot<sup>RA(373)</sup>.
- 10 || Selbstmörderische Neigung aus religiöser Verzweiflung.
- || Hält sich selbst für hervorragend; verschwendet sein Geld; stolz auf seine Stellung.
  - || Sechs Tage lang kein Schlaf; sieht ständig Leute um sich herum, spricht zu ihnen; schreit auf; singt; kennt niemanden, beachtet nichts; lacht häufig; antwortet nicht, wenn angesprochen; möchte nichts; entleert unbewußt Harn und Kot; keine Hitze im Gesicht; Puls normal; entband zwei Wochen zuvor.
  - || Nach einer schweren Krankheit, Abneigung gegen Ehemann und Kinder; Verlangen das Haus zu verlassen; Sinnestäuschungen (Halluzinationen), das Zimmer schien voller Leute, die sich hineindrängten, sodaß kein Platz mehr war; jede Erscheinung personifizierte eine spezielle Person und leistete ihr stundenlang Gesellschaft; sie sah und unterhielt sich mit Gestalten neben ihr, konnte nicht immer zwischen Anschein und Wirklichkeit unterscheiden.
  - || Schmerzanfalle mit Delirium, treiben zum Wahnsinn.
- 15 || Delirium: religiös oder überschwenglich; schwerer, soporöser Schlaf; unruhig, durstig, Krämpfe in den Beinen, kalter Schweiß, Kribbeln; unregelmäßiger Puls; bei zerebrospinaler Meningitis.
- Leichtes Delirium; Kälte am ganzen Körper, offene Augen mit heiterem, manchmal lachendem Gesichtsausdruck; schwatzt über religiöse Themen und über zu erfüllende Gelübde, betet, glaubt, daß er nicht in seinem eigenen Hause sei.<sup>RA7</sup>
- || Ein Neigung zu heftigen Ausbrüchen, Verlangen die um ihn Stehenden zu schlagen.
- Anfälle von Wut mit Schwören; Neigung wegzulaufen.
- || Eine Frau, 36 Jahre alt, hat Lectrophilie, rotes brennendes Gesicht, Angst, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, andauerndes Stöhnen und Aufschreien ohne einen Grund; ißt oder trinkt nichts, ist schlaflos; herbeigeführt durch sexuelle Erregung.
- 20 || Beständiges Rasen mit großer Hitze des Körpers.

- || Wahnsinn: mit Verlangen alles zu zerschneiden und zu zerreißen, besonders die Kleidung<sup>RA(371)+</sup>; mit Unzucht und wollüstigen Reden; religiöser oder sexueller; Größenwahn.
- || Nymphomanie mit Gewalttätigkeit und Zerstörungswut; war in der Liebe enttäuscht worden; Schwermut; von Zeit zu Zeit geschwätzig; großes Verlangen nach Geschlechtsverkehr; ohne Schamgefühl; unanständig; sehr lästig, verlangt engste Zuwendung; war ein Jahr lang in einer Anstalt gewesen.
- || Kindbettpsychose und Krämpfe mit starker Hirnkongestion; bläuliches und aufgedunsenes Gesicht; vorstehende Augen; wildes Aufschreien, mit Veranlagung zu beißen und zu zerreißen.
- || Neigt zu Schweigsamkeit oder über die Fehler anderer zu sprechen; wenn gereizt, schilt und schmäht.<sup>RA296-299+</sup>
- 25 || Verlangen im Hause umherzugehen. *θ* Hysterie.
- || Jagt seine Familie aus dem Hause; behauptet die Sonne zöge um die Erde; Furcht vor dem Tode, Unruhe, Verzweiflung; törichte Aktivitäten.
- || Geschwätzigkeit, er spricht schnell.
- || Spricht viel über religiöse Themen; betet; ist übergewissenhaft.
- || Schlaflosigkeit: Gesicht verzerrt; weint; betet, sagt es sei ein Geheimnis und ein Unglück; lehnt ab zu sprechen, bewegt nur die Hände; dreht die Hände im Kreise herum, sagt, sie müsse sich stärken und dann werden die Bewegungen heftiger; klagt über Staub im Halse; bildet sich ein im Himmel zu sein und mit Gott zu sprechen. *θ* Wahnsinn.
- 30 || Ständiges Sprechen, wilder Ausdruck des Auges, ständiges Lächeln, von Zeit zu Zeit lautes Lachen; verzerrt das Gesicht und stößt irgendjemanden, der sich ihm nähert, zurück; will nicht auf Fragen antworten; läuft hinter den Tisch und schilt; lehnt das Essen ab.
- || Vollständige Schlaflosigkeit; spricht ständig; beim Hören irgendeines Geräusches, wie das Schlagen einer Uhr o. a., wird er (sie) rasend, tanzt herum, muß gehalten werden; schnelle Sprache.
- || Er stöhnt, ist außer sich.
- || Flucht und heult die ganze Nacht.
- || Flucht die ganze Nacht und klagt über ein betäubtes Gefühl mit Kopfschmerzen und Speichelfluß.
- 35 || Brüllt und tobt, fünf Männer konnten sie kaum beherrschen; zerreißt ihre Kleidung; blasse verzerrte Gesichtszüge; Blick drohend, wild; Haare aufgelöst; äußert Töne, die mehr einem Tier als einem Menschen zu gehören scheinen, beißt, schlägt um sich, spuckt; Körper in ständiger schwankender Bewegung; murmelt und stöhnt; beachtet keine Fragen; ißt nichts; gänzlich schlaflos.
- || Küßt jeden; vor den Menses.<sup>RA(381)</sup>
- || Unverschämtes Betragen im Kindbett.

- || Schweigsam; Abneigung zu sprechen, außer im Delirium.  
Kann nicht ertragen allein gelassen zu werden.
- 40 | Niedergeschlagenheit und Verzagtheit.  
| Furcht und Angst<sup>RA306</sup>; Furcht benimmt den Atem.  
| Furchtsamkeit: fährt auf; mit Umherlaufen und Schreien.<sup>RA(387),(389)</sup>  
| Ängstlich, unruhig, leicht erschreckt, jammert, weint, ist gleichgültig, deliriert, blau im Gesicht. *θ* Typhus<sup>†</sup>.  
|| Kalter Schweiß auf der Stirn<sup>RA23</sup>, mit quälender Angst und Furcht vor dem Tode.
- 45 | Kann acht Stunden lang nicht aufstehen, muß entweder sitzen oder liegen; wenn er steht, wird er von furchtbarer Angst gequält, wovon die Stirn mit kaltem Schweiß bedeckt und ihm zum Erbrechen übel wird.  
| Angst wie von einem schlechten Gewissen, als habe er ein Verbrechen begangen.<sup>RA312</sup>  
| Angst wie nach Begehen einer schlimmen Untat, < am Abend und nach dem Mittagessen.
- || Ein verkrüppeltes Mädchen fiel plötzlich in Krämpfen nieder, wurde zu Bett gebracht und hatte einen Schüttelfrost; saß auf in halbbewußtem Zustand, lehnte Hilfe, Essen oder Trinken ab; Angst mit Stöhnen und Seufzen die ganze Nacht lang; schilt ihren Vater, weil er an der Revolution teilgenommen habe; meint sie höre die Trommel, die seine Hinrichtung ankündigt; dies wird gefolgt von stillem Grübeln und gelegentlichem Auffahren; Meneses unterdrückt, Bauch gespannt, Gesicht blaß, Arme kalt, Augen starr mit verengten Pupillen; Puls langsam und fast un wahrnehmbar.  
| Schwermut, der Kopf hängt herunter, sitzt und grübelt schweigend.<sup>RA309-</sup>
- 50 | Religiöse Schwermut oder Nymphomanie mit Verlangen jeden zu umarmen, selbst leblose Gegenstände; großer Durst auf sehr kaltes Wasser; ständig heftiges Verlangen nach kühlen und erfrischenden Sachen. *θ* Kindbettpsychose.  
| Verzweiflung; Hoffnungslosigkeit, Verlust des Mutes.<sup>RA307-</sup>  
| Verzweiflung über seine Stellung in der Gesellschaft, fühlt sich sehr unglücklich.  
|| Zweifelt an ihrer Erlösung; bei unterdrückter Monatsblutung.  
|| Verzweifelt an seiner Wiederherstellung; versucht Selbstmord. *θ* Wahnsinn.
- 55 | Nach Schreck: Furcht, Angst; Kälte; Ohnmacht; unwillkürliche Diarrhoe.  
|| Folge von verletztem Stolz oder Ehre. *θ* Geisteskrankheit. *θ* Hysterie.
- 2 **Sensorium.** | Schwindel: mit kaltem Schweiß an der Stirn; mit Verlust des Sehvermögens; plötzliche Ohnmacht; von Opiumessen; nach Mißbrauch von Tabak oder Alkohol.  
Schwere des Kopfes, Gegenstände scheinen im Kreise zu wirbeln<sup>RA1,(19)</sup>.  
*θ* Typhus<sup>†</sup>.

- | Fällt in Ohnmacht: von geringster Anstrengung, sich Umdrehen im Bett, Anstrengung beim Stuhl, Würgen wie zum Erbrechen usw.; von leichten Wunden; von heftigen Schmerzen; nach Flüssigkeitsverlust; mit Angst, Übelkeit, krampfhaften Zuckungen.
- Ohnmacht nach vorhergehender großer Ängstlichkeit oder Mutlosigkeit, oder begleitet von Krämpfen, Kiefersperre, krampfartigen Bewegungen der Augen, der Augenlider usw.
- <sup>3</sup> **Kopf.** Brennen im Gehirn.
- Anfallweiser Schmerz hier und dort im Gehirn, bestehend aus einem Gefühl wie zerschlagen und Druck.
- || Gefühl eines Eisklumpens im Scheitel.
  - | Kopfneuralgie mit Verdauungsschwäche; Gesichtszüge eingesunken.
- <sup>5</sup> Kopf heiß und schweißbedeckt; Kinder reiben den Kopf, können nicht ertragen allein gelassen zu werden; legen die Hände an den Kopf. *θ* Typhus<sup>↑</sup>.
- | Kopfschmerz: mit Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe, blassem Gesicht; mit Erbrechen von grünem Schleim<sup>RA(12)</sup>; wie ein Druck auf dem Scheitel; steifer Nacken<sup>RA(27)</sup>; häufiges und sehr reichliches Urinieren<sup>RA(22)</sup>; als sei das Gehirn in Stücke gerissen; chronisch, tritt nachmittags auf, dauert die Nacht hindurch an; Ziehen in beiden Armen; > gegen Morgen; heftige Schmerzen treiben zur Verzweiflung; große Erschöpfung; Ohnmacht, mit kaltem Schweiß und großem Durst; mit hartnäckiger Verstopfung; nervöser, bei jeder Menstruationsperiode, bei Mädchen und hysterischen Frauen; < von Bewegung, besonders von Rücken.
  - || Drückender, pochender, nervöser Kopfschmerz befällt eine Seite, mit Steifheit des Nackens und Gefühl, als würde der Kopf zerspringen; Erbrechen.
  - | Migräne (Hemikranie).
  - | Neuralgie des Kopfes mit Dyspepsie; Augen und Brust eingesunken, kalte Glieder.
- <sup>10</sup> | Kopfschmerzen mit Übelkeit oder Erbrechen, bei denen die Diurese zu einer Krise kommt.
- | Das Blut schießt heftig zum Kopf beim Rücken.<sup>RA18</sup>
  - | Hyperämie des Gehirns von Keuchhusten.
- || Sopor; Augen, halb geschlossen; Gesicht blaß, abgemagert; wirft den Kopf herum und schreit; bohrt den Kopf ins Kissen; vorübergehende Wallungen im Gesicht; stößt die Decken weg; wenn der Kopf gehoben wird, fällt er zur li. Seite; Augen trübe, Pupillen verengt; Hornhaut sieht aus wie gemahlene Glas, ist bedeckt mit einer dünnen Schicht von Schleim, der in den Augwinkeln trocken geworden ist; laute Schreie wecken ihn nicht aus dem Sopor auf; wenn hochgehoben, Aufstoßen und Würgen; Puls schwach, langsam; lehnt das Stillen ab; Kopf heiß, der übrige Körper kühl. *θ* Hirnhautentzündung.

- ┃ Zerebrospinale Meningitis; kalter Schweiß am ganzen Körper, Erbrechen mit Magenkrämpfen; großer Durst auf eiskaltes Wasser oder verlangt Eis; Muskeln des Kopfes zu schwach den Kopf zu stützen; Puls unregelmäßig, sehr schwach und langsam; Kälte herrscht vor; andauernde große Schwäche; Krämpfe in den Beinen; möchte dem Bett entfliehen; schwerer komatöser Schlaf.
- 15 ┃ **Hirnhautentzündung;** heftige Kopfschmerzen mit Delirium oder Bewußtlosigkeit; reichliches Erbrechen, blasses, kaltes und leichenartiges Gesicht; Steifheit des Nackens, erstickendes Würgen im Halse, Gefühl als ob der Kopf zerspringen würde; rollt den Kopf heftig von einer Seite zur anderen, mit kurzen Schreien, bohrt den Kopf ins Kissen; krampfartige Erschütterungen und Erbrechen, sobald der Kopf erhoben wird; klonische und tonische Krämpfe mit Verlust des Empfindungs- und Bewegungssinnes; Krämpfe in den Gliedern; Kribbeln und Kälte in den Gliedern; choleraartiger Kollaps, gleichzeitig mit starkem Blutandrang.
- ┃ Hydrozephaloid; große Ungleichheit in der Verteilung der Hitze; Haut kalt und klamm; Erbrechen und alle Symptome < beim sich Aufrichten, und vergleichsweises Wohlfühlen in horizontaler Lage; geringste Bewegung verursacht Übelkeit und Erbrechen; Kraftlosigkeit in den Gliedern; steifer Nacken, starke Neigung zu Krämpfen; großer Durst auf Eiswasser oder Eis; entstelltes blasses Gesicht oder Röte einer Wange; große Erschöpfung nach einem Stuhl.
- 4 **Äußerer Kopf.** Kopf brennend heiß; Glieder abwechselnd heiß und kalt.
  - ┃ Kopfhaut sehr empfindlich, bei Kopfschmerzen.
  - ┃ Gefühl, wie ein Stück Eis auf dem Kopf; oder von Wärme und Kälte zur gleichen Zeit an der Kopfhaut, Haare empfindlich.
  - Gefühl in den Haaren an der re. Seite des Kopfes, als ob ein Haarbüschel elektrisiert sei, Kribbeln und Sträuben der Haare, mit leichten Kälteschauern der Haut unter den Haaren.<sup>RA(26)</sup>
- 5 ┃ Gefühl von Wundsein<sup>o</sup> des Kopfes mit Übelkeit.
  - ┃ Weichselzopf (Plica polonica).
  - ┃┃ Kalter Schweiß auf der Stirn.
  - Gezwungen die Stirn zu reiben, mit einer Art von Empfindungslosigkeit. θ Typhus<sup>†</sup>.
  - ┃ Hals zu schwach um den Kopf aufrecht zu halten. θ Keuchhusten. θ Hirnhautentzündung.
- 5 **Augen und Sehen.** Kleine schwarze Punkte oder Flecken vor den Augen, mit Diplopie; Lichtscheu; < beim Aufstehen aus dem Bett oder vom Stuhl.
  - ┃ Hämophthalmus<sup>1</sup>.
  - ┃┃ Hämophthalmus mit nächtlicher Diarrhoe.

<sup>1</sup> oder Hämalops = Bluterguß ins Auge

Vermindertes Sehvermögen; erweiterte Pupillen<sup>RA26,(30)</sup>.

- 5 | **Augen:** nach oben gedreht, zeigen nur die Skleren<sup>RA(49)</sup>; verdreht, heraustretend<sup>RA30</sup>; starr, wäßrig, eingesunken, glanzlos<sup>RA(47)-</sup>; voller Tränen<sup>RA(41)+</sup>; Lider fahl, blaue Ränder; umgeben von schwarzen Ringen<sup>RA29-</sup>; sehen schwach aus; sehen gelb oder blau aus<sup>RA(48)-</sup>.

| **Pupillen:** zusammengezogen; erweitert bei Sehschwäche; erkennt die Nahestehenden nicht, oder nur langsam<sup>RA(31)</sup>.

Reißende Schmerzen in den Augen, rauben den Schlaf<sup>RA40-41</sup>; < in kaltem, feuchtem Wetter. *θ* Rheumatische Augenentzündung.

Drücken in den Augen.

Hitze in den Augen.<sup>RA37</sup>

- 10 | **Sehr große Trockenheit der Lider**<sup>RA33</sup>; besonders nach Schlafen; schmerzhaft, wie wundgerieben; steif und verklebt.<sup>RA34</sup>

| **Starkes Trockenheitsgefühl im Oberlid**, als ob Salz zwischen Lid und Augapfel sei.<sup>RA(36)+</sup>

| **Lider:** schwer, kann sie kaum heben; zitternd; gelähmt.<sup>RA32</sup>

Sehr reichlicher Tränenfluß und schneidende Schmerzen, mit Gefühl von Trockenheit und Hitze.<sup>RA36</sup>

Häufiger Tränenfluß mit Röte der Augen wie bei Schnupfen.<sup>RA(41)</sup>

- 15 11 **Neuralgie des rechten Oberlides;** Schmerz stark bei geringstem Druck oder leisester Berührung, als ob Hunderte von feinen Nadelspitzen plötzlich in das Lid stoßen würden; konnte am Morgen gleich beim Erwachen die Augen nicht öffnen, es schien, als ob die Innenfläche der Lider zu trocken sei und daß sie am Augapfel festkleben würden.

6 | **Ohren und Hören.** Taub, als seien die Ohren verstopft.<sup>RA52</sup>

7 | **Nase und Geruch.** Geruch in der Nase wie von Dung oder Rauch.<sup>RA56</sup>

| **Nase:** wird spitzer, scheint länger; eiskalt.

| **Nasenbluten:** rechtsseitig, nur nachts im Schlaf<sup>RA58</sup>; Gesicht totenblaß, Körper kalt; Puls langsam, intermittierend.

Gefühl, als ob die Nase innen vollständig trocken sei.

- 5 | **Bohren in der Nase.**

Häufiges Niesen.<sup>RA(228)</sup>

8 | **Obere Gesichtshälfte.** | Unruhiger, wilder Blick; blasses, verzerrtes Gesicht.

| **Blaue oder grüne Ringe um die Augen.**

| **Gesicht:** kollabiert, blaß, bläulich; Nase spitz; bleifarben; rot im Bett, wird blaß beim Aufstehen; abwechselnd blaß und rot<sup>RA(339)+</sup>; Risus sardonicus; eingesunken, mit ängstlichem Gesichtsausdruck; verkniffen, totenähnlich, hippokratisch<sup>RA43</sup>.

|| **Kalter Schweiß im Gesicht**, besonders an der Stirn.<sup>RA276-</sup>

- 5 | **Neuralgie**, ziehende, reißende Schmerzen, mit bläulichem, blassem Gesicht, eingesunkenen Augen; Erschöpfung.



- ▮ Reiß in Wangen, Schläfen und Augen, mit Hitze und Röte, treibt zum Wahnsinn; < bei feuchtem Wetter; an der re. Seite oder von links nach rechts; besonders bei anämischen Personen.
- 11 Plötzlich aus dem Schlafe geweckt von starkem Anfall von Gesichtneuralgie; li. Gesichtshälfte und Kopf betroffen; weint ständig; Schmerz ununterbrochen, nicht > von Wärme; Gesicht rot, besonders an der betroffenen Seite, die heiß und bläulichrot ist; li. Auge ist blutüberfüllt (injiziert); Schmerz in supra- und infraorbitalen Nerven und Nervenästen; Zittern des ganzen Körpers; Gliederzucken; nach dem Anfall allgemeiner kalter Schweiß und Erschöpfung.
- 11 Intermittierende Stirnneuralgie; Gesicht sehr blaß, Augen eingesunken, trübe; Kälte der Glieder; fast alle fünfzehn Minuten Erbrechen von grünlichgelbem Serum, hört auf, wenn der Schmerz nachläßt. θ Gesichtneuralgie.
- ▮ Trigemineuralgie mit Erbrechen, blassem, eingefallenem Gesicht.
- 10 ▮ Akne rosacea.
- 9 **Untere Gesichtshälfte.** Lippen: bläulich oder hängen herab; reibt Mund und Nase; trocken, schwarz, ausgetrocknet; runzlig, blaß oder schwarz und aufgesprungen.
  - ▮ Schwarz um Mund und Nasenlöcher. θ Typhus<sup>↑</sup>.
- Zucken in den Wangen, Funken vor dem li. Auge, Blässe des Gesichtes und ohnmächtige Schwäche, gefolgt von Erbrechen einer Menge von weißem Schaum.<sup>RA(63)</sup>
- Krämpfe der Muskeln beim Kauen.<sup>RA(77)-</sup>
- 5 Kiefersperre.<sup>RA66</sup>
  - Risus sardonius.
  - ▮ Steifheit der Kaumuskeln.
  - Schaum aus dem Munde.<sup>RA64</sup>
- 10 **Zähne und Zahnfleisch.** ▮ Heftiger Zahnschmerz, pochend; Gesicht geschwollen, kalter Schweiß auf der Stirn; Übelkeit im Magen, Galleerbrechen, Mattigkeit der Glieder, starkes Sinken der Kräfte, sogar bis zur Ohnmacht, äußere Kälte und innere Hitze, Durst auf kalte Getränke kaum zu befriedigen.
  - ▮ Heftig pochender Zahnschmerz treibt zum Wahnsinn; nervöse, reizbare Personen.
  - Die Zähne fühlen sich schwer an, wie mit Blei gefüllt.
  - Zahnschmerz, mit Schmerzen im Kopf und rotem, geschwellenem Gesicht.
- 5 Knirscht mit den Zähnen.<sup>RA(82)</sup>
- 11 **Geschmackssinn und Zunge.** Geschmack: bitter; und kalt, wie von Pfefferminz<sup>RA84</sup>, schal oder süßlich; faulig; vermindert; teigig; sauer.
  - ▮ Zunge: blaß, kalt, welk; geschwollen, trocken, aufgesprungen und zu rot; weiß mit roter Spitze und Rändern; gelblichbraun belegt; hinterer Teil schwarz.
  - ▮ Sprache lispelnd, stotternd<sup>RA(89)-</sup>; als ob die Zunge zu schwer sei. θ Typhus<sup>↑</sup>.

- 12 **Innerer Mund.** Schaum vor dem Mund; Krämpfe.
- ! Mund trocken und klebrig<sup>RA(98)</sup>; Speichel verringert.
  - ! Trockenheit im Mund und Gaumen, mit Durst.<sup>RA(75)-(97)</sup>
  - ! Brennen in Mund und Hals.<sup>RA(92+,93)</sup>
- 5 Kühles Gefühl im Munde wie von Pfefferminz.<sup>RA84</sup>
- ! Ständiger Speichelfluß wie Wasseraufschwulken.<sup>RA93,(101)</sup>
- Speichelfluß, mit Übelkeit und scharfem, salzigem Geschmack.<sup>RA(106)+</sup>
- 13 **Hals.** Trockenheit im Halse, kann nicht von Trinken beseitigt werden.
- Kratzen oder Rauheit im Halse<sup>RA73</sup>; Gefühl von Staub.
  - ! Kältegefühl oder Brennen im Halse.
  - ! Zusammenschnürungsgefühl des Halses; krampfartig, mit Erstickung.
- 5 ! Spastische Erkrankungen der Speiseröhre, hat Lähmung der Speiseröhre zur Folge; fast alle eingenommenen Speisen und Getränke werden ausgeworfen, mit Erstickungsgefühl, Röte und Hitze im Gesicht.
- !! Chronischer Katarrh der Speiseröhre mit Asthma.
- Gefühl von Erweiterung des Rachens.
- !! Schwellung der sublingualen oder re. Unterkieferdrüse, auch der Wange, des äußeren Halses, der Kehle und des weichen Gaumens; spannende stechende Schmerzen; ständige Ansammlung von Speichel, den er nicht schlucken kann; Furcht vor Erstickung; kann nicht deutlich sprechen; remittierendes Fieber, jeden zweiten Tag <, Abendverschlimmerung; Delirium nachts; Anorexie (Appetitmangel); Präkordialangst; trockener Husten; Rücken- und Hüftschmerzen; trockener Stuhl; rötlichbrauner Harn; Schwellung verstärkt oder wird geringer, wenn das Fieber steigt oder fällt.
- 14 **Appetit, Durst, Verlangen und Abneigungen.** ! Gefräßiger Appetit.  $\theta$  Nach Typhus<sup>†</sup>.
- Hunger: zwischen den Anfällen von Erbrechen<sup>RA94</sup>; bei Diarrhoe<sup>RA(202)+</sup>.
- !! Anfälle von Heißhunger (Bulimie), stark, aber von kurzer Dauer, sogar kurz nach einer ausgiebigen Mahlzeit, besonders nach körperlicher Bewegung im Freien; wenn der Heißhunger nicht sogleich befriedigt wird, wird er (sie) befallen von großer Schwäche, Übelkeit und Erbrechen, Dunkelheit vor den Augen und Klingeln im Ohr; wird schwindlig, Hände zittern, tobt und fällt schließlich in einen Anfall tiefer Bewußtlosigkeit; der Anfall wird verhindert von ein wenig Essen beim Einsetzen; Anfall nach vorhergehendem Gefühl von Wärme und Prickeln in den Fingern und Zehen und Muskelzucken im Gesicht.
- Appetit vermindert, Mund wie umgeben von Schleim; schaler oder süßlicher Geschmack.
- 5 ! Durst: trinkt häufig aber nur wenig auf einmal; möchte alles kalt trinken<sup>RA(341)</sup>; beim Schwitzen; auf große Mengen sehr kaltes Wasser und saure Getränke.
  - !! Durst auf kälteste Getränke; verlangt Eis.

- ▮ Verlangt Obst, saftiges oder kaltes Essen, salzige Sachen, Hering, Sardinen usw.<sup>RA(124)-</sup>
  - ▮ Schlechter von Fleisch essen und Milchtrinken.
  - Abneigung gegen warme Speisen.<sup>RA(123)-,77+</sup>
- <sup>10</sup> ▮ Schlechte Folgen: von Opiumessen; Tabakkauen.
- <sup>16</sup> ▮ **Schluckauf, Aufstoßen, Übelkeit und Erbrechen.** ▮ Schluckauf<sup>RA(111)</sup>: nach heißen Getränken; von Krämpfen der Speiseröhre mit Übelkeit.
- Aufstoßen heftig, leer<sup>RA88,(117)</sup>, sauer oder bitter<sup>RA90</sup>.
- ▮ Übelkeit: mit Schwäche, muß sich hinlegen; mit Gefühl von Ohnmacht; mit heftigem Durst, gefolgt von heftigem und häufigem Erbrechen; mit sehr reichlichem Speichelfluß<sup>RA(135)</sup>; mit großem Appetit und Durst<sup>RA(133)</sup>; < von geringster Bewegung; ohnmachtsähnliche Brechübelkeit mit Schaum aus dem Munde<sup>RA(139)</sup>.
- ▮ Erbrechen: gewaltsam, sehr stark<sup>RA(161)</sup>; heftig mit anhaltender Übelkeit, Würgen und großer Erschöpfung; dünner schwärzlicher oder gelblicher Massen; von Galle und Blut, schwarz<sup>RA(159)</sup>; von Speisen und Getränken, oder nur Getränken; von Essen oder saurem, bitterem, schaumigem, weißem oder gelblichgrünem Schleim<sup>RA(145-47-53)+</sup>; immer, wenn er sich bewegt oder trinkt; mit Schwindel, blassem Gesicht, reiner Zunge, gutem Appetit; mit Schluckauf und Ohnmacht; mit schmerzhaftem Einziehen des Bauches; mit schmerzhafter Verzerrung des Gesichtes; mit kalten Schweißen; mit Diarrhoe und Druck in der Magengrube.
- <sup>5</sup> ▮ Vor dem Erbrechen, kalte Hände, werden später heiß.<sup>RA(162)</sup>
- ▮ Essen verursacht Schmerz beim Durchgang durch die Speiseröhre; Erstikungsgefühl beim Schlucken von Essen oder Trinken; Hochwürgen einer Essensportion; beinahe zwei Jahre lang wurden fast alle eingenommenen Speisen und Getränke sehr kurz nach den Mahlzeiten ausgeworfen; Erbrechen mit einem Erstickungsgefühl, Röte und Hitze im Gesicht; sehr stark abgemagert und schwach; ein starkes Verlangen nach Essen, aber scheut sich zu essen; verstopft, niedergeschlagen; Herzklopfen, schwacher Puls und kalte Glieder.
- ▮ Morgens beim Aufstehen Übelkeit, Aufstoßen, Speichelfluß, Schwindel, Diarrhoe und Erbrechen; Appetit gut, aber muß gleich nach dem Essen erbrechen; erbricht Tag und Nacht; drei bis sechs dünne, schleimige, bräunliche Stühle; Schwindel Abmagerung; Mattigkeit.
- ▮ Krampfartiges Würgen und Erbrechen wäßriger geschmackloser Flüssigkeit; Verstopfung; reißende Schmerzen in den Gliedern.
- ▮ Erbrechen von Essen und großer Massen von Schleim.<sup>RA(145)-</sup>
- <sup>10</sup> ▮ Schaumiges Erbrechen, gefolgt von gelbem Eiter oder Galle; intermittierender Puls.  $\theta$  Hirnhautentzündung.  $\theta$  Lungenentzündung.
- ▮ Kind, 6 Monate alt, liegt ruhig und betäubt; Gesicht blaß; Stirn kalt und feucht beim Erbrechen.

17 **Magengrube und Magen.** In der Magengrube: **!** große Angst; schmerzhaftes Auftreibung; Druck<sup>RA111+</sup>; scharfer Schmerz; große Empfindlichkeit; Brennen.

Schmerz im Magen wie von Heißhunger.<sup>RA106</sup>

Gefühl von Schwäche im Magen, mit innerem Kältegefühl.<sup>RA107</sup>

**!** Hysterische Magenkrämpfe.

- 5 **!** Schmerz tritt allmählich auf, zuerst im Oberbauch, von dort ausstrahlend nach oben und zu beiden Seiten, reicht bis zum Rücken zwischen den untersten Punkten der Schulterblätter; wird quälend, läßt dann allmählich nach; schüttelt vor Kälte. *θ* Magenkrampf (Gastrodynie).
- 11 Sehr quälende Beschwerden über Herz und Oberbauch, totenähnliches Aussehen, konnte nur wenige Worte sprechen, kalt, Puls schwach und flatternd und gerade noch spürbar, Übelkeit und Versuch zu erbrechen, > von Reiben der Wirbelsäule zwischen den Schulterblättern; Folge einer Anwendung von starkem Liniment für Neuralgie der Schultern, des Rückens und der Arme.
- 11 Zehn Minuten nach dem Essen fingen die Speisen an mundvollweise zurückzukommen und dies hielt mit Unterbrechungen zwei Stunden lang an; krampfartiger Schmerz im Oberbauch, < eine Woche lang nach den Menses, Erbrechen mit heftigem Schmerz in den Lenden; Menses regelmäßig, aber zu profus; Verstopfung; außerordentlich schwach; pochender Schmerz in der re. Schläfe. *θ* Gastralgie.
- 11 Stark brennendes Gefühl erstreckt sich in die Speiseröhre; Erbrechen grünlicher Massen; große Angst; Kälte der Glieder; langsamer, aussetzender Puls. *θ* Gastritis.
- !** Bluterbrechen mit langsamem Puls, Kälte, Ohnmachtsanfällen, und kaltem Schweiß.
- 10 11 Schmerz unter den Schulterblättern; Verlust des Sehvermögens; Schwindel; Harn dick bei der Entleerung und sehr dunkel, manchmal fast schwarz; kalte Schweiß von Zeit zu Zeit; Essen hat keinen Geschmack; Rauchen macht den Hals trocken und er genießt es nicht; heftiges Verlangen nach Essen; Übelkeit beim Essen, kann das Essen nicht ohne Würgen herunterkriegen; Zunge weiß.
- 11 Dicker bräunlichweißer Belag auf der Zunge; Abneigung gegen Essen; Versuch zu essen verursacht Übelkeit und Erbrechen; pappiger, schaler, aber besonders süßlicher Geschmack im Munde; Stumpfheit des Gemütes; Mangel an Lebenswärme; Frösteln, sucht Wärme. *θ* Magenverstimmung.
- 11 Schmerz eine halbe Stunde nach dem Essen oder nach Gehen oder sonst Müdigkeit. *θ* Verdauungsschwäche.
- 11 Dyspepsie; starker Schmerz eine Stunde nach dem Essen; Wasseraufschwellen; lockere Darmentleerungen, drei oder vier nachts; Harn beladen mit Steinablagerungen; große Schwäche.

- ! Chronische Magenschwäche; von Feuchtigkeit des Klimas und Mangel an frischer Luft; nach Mißbrauch von Chinin.
- 15 || Alle Obstarten erzeugen schmerzhaftige Auftreibung des Magens.
  - !! Magenkatarrh, große Schwäche, Kälte, plötzliche Flauheit.
  - || Magenerweichung (Gastromalazie); Übelkeit vor der Ohnmacht; Erbrechen grünlich, sauer; reichlich, wäßrig, ohne Geruch; Kolik, Kollaps, Krämpfe.
  - || Magenerweichung bei Kindern, im Verlauf eines Hydrozephaloids.
  - ! Bluterbrechen mit langsamem Puls, Kälte, Ohnmachtsanfällen, kaltem Schweiß; Übelkeit beim Bewegen oder Aufstehen.
- 18 **Hypochondrium.** ! Hyperämie der Leber, Magenkatarrh, fauler Geschmack, Widerwillen gegen warme Speisen, starker Druck in der Lebergegend, im Wechsel mit Erbrechen und Diarrhoe.
  - ! Hyperämie der Leber, mit choleraartigen Symptomen, oder mit Asthma und Bronchialkatarrh.

Milz geschwollen. *θ* Wechselfieber.

  - ! Krämpfe des Zwerchfells während vorherrschender Südwinde, bei Leuten mit kalten Händen, starker Beklemmung und Angst in der Brust.
- 5 ! Zwerchfellentzündung mit Peritonitis, Erbrechen und Kälte.
- 19 **Bauch.** ! Starkes Flauheits- und Leeregefühl.
  - || Leeregefühl im Bauch nach dem Stuhl, als bräuchte sie Essen; Kopfschmerz auf dem Scheitel um 6 Uhr abends.
  - !! Kältegefühl im Bauch.
  - ! Brennen im Bauch wie von heißen Kohlen.
- 5 ! Schneiden im Bauch wie mit Messern.<sup>RA113</sup>

Bauchkneifen, zeitweise über, zeitweise unter dem Nabel, nachmittags kurz nach dem Essen.<sup>RA(178)</sup>

  - || Intermittierende Neuralgie der Därme; fängt etwa um 4 Uhr nachmittags an Mengen von Blähungen auszustoßen, um 5 Uhr nachmittags: starke, quälende Neuralgie, als ob Messer ihre Därme schneiden würden, befällt hauptsächlich die li. Seite, kommt auf in Abständen von ein paar Minuten, so stark, daß drei oder vier Männer nötig waren, um sie zu halten; die Anfälle dauerten von 3 Uhr bis 9 Uhr abends, hörten danach mit zwei tiefen Seufzern oder Gähnen auf.
  - || Heftige Anfälle von Neuralgie; eine bestimmte Bewegung wurde am Nabel gespürt, danach plötzlich ein Kneifen wie von einer Zange, immer an der gleichen Stelle, ein ganz unerträglicher Schmerz, hielt eine halbe oder eine ganze Minute an; er ging jedesmal weg mit Darmkollern, das sich zur zökalen Region erstreckte; Zusammenschnürungsgefühl über und unter derselben hinderte die Blähungen abzugehen; Angstanfälle und Schmerz steigerten sich von einer halben zu einer ganzen Stunde, der Bauch war geschwollen und wurde schmerzhaft bei Berührung; Neigung zu erbrechen, Brust zusammengeschnürt, Atmung kürzer, immer mühsamer, kalter Schweiß, Betäubung und

völlige Erschöpfung; konnte keinen Tropfen Flüssigkeit schlucken, noch weniger irgendeine feste Nahrung; lag viele Stunden betäubt, bewußtlos, mit geschwellenem Gesicht und vorstehenden Augen, ohne Schlaf; > nachdem Blähungen nach oben oder nach unten abgingen.

‡ Kolik; Gesicht blaß; Bauch eingesunken, gedunsen während des Anfalles; Schmerz besonders im Oberbauch; brennender Schmerz unter den li. Rippen; Empfindlichkeit gegen Druck; Schmerz am ganzen Bauch erstreckt sich zum Rücken und den Oberschenkeln; hier und dort harte Stellen im Bauch; schließlich Luftaufstoßen mit Besserung; Verstopfung; Appetitsverlust; Zunge belegt; von Zeit zu Zeit Erbrechen, Frösteln; Mattigkeit; Schlaflosigkeit.

<sup>10</sup> †† Kolik: mit Brennen; als ob die Därme verknotet wären; nach einer Erkältung; Drehen, Verdrehen, Druck, Zusammenschnüren, Schneiden, Spannung; nach Mißbrauch von Chinin; von Obst und Gemüse; Bauch geschwellen, empfindlich; keine Blähungen, nach keiner Seite; kalter Schweiß; mit brennender Schmerz, Verdrehen, Schneiden, Übelkeit und Erbrechen, < von Essen; > nach abgehenden Blähungen; bei morgendlicher Diarrhoe.

‡ Seit mehreren Jahren Auftreibung des Bauches, manchmal im Magen und manchmal in den Därmen, mit heftigem Aufstoßen, tritt auf um 4 Uhr morgens und dauert zwei Stunden, etwas > von Trinken warmer Flüssigkeiten.

‡ Bauch aufgetrieben<sup>RA(164)</sup>, sehr empfindlich.

‡ Schmerzhaftes Einziehen des Bauches während des Erbrechens.

‡ Darmeinstülpung (Intussusceptio); große Ängstlichkeit; rennt zusammengekrümmt herum, drückt auf den Bauch.

<sup>15</sup> †† Plötzliche starke Schmerzen im li. Hypochondrium, mit Anfällen von Erbrechen; Schlaflosigkeit; starke Schmerzen im absteigenden Dickdarm; hartnäckige Verstopfung; Rumoren und Gluckern im Bauch auf Druck.  $\theta$  Darmeinstülpung.

‡ Peritonitis mit Erbrechen und Diarrhoe, Haut kalt; Gesichtszüge eingesunken; Puls klein, schwach; unruhig, ängstlich.

‡ Einklemmter Bruch, nicht entzündet; antiperistaltische Tätigkeit; kalter Schweiß, Übelkeit.

Hervortreten des Leistenbruchs während des Hustens.

<sup>20</sup> † **Rektum und Stuhl.** †† Stühle: häufig; wäßrig, grünlich, gemischt mit Flocken; herausspritzend, sehr reichlich; Reiswasserstühle mit tonischen Krämpfen, beginnen in Händen und Füßen, breiten sich im ganzen Körper aus; Gesicht eingesunken, sogar hippokratischer Gesichtsausdruck; wäßrig, geruchlos; wäßrig, herausspritzend, flockig; dünn, breiig, schleimig; grün, herausspritzend, erschöpfend nach Schreck; bräunlich, wäßrig; schwärzlich, wäßrig; blutig; gallenartig; schleimig; ätzend; manchmal schmerzlos; unwill-

- kürlich (während abgehender Blähungen); von geringster Bewegung des Körpers; dünn und schmerzlos, mit Rumoren der Därme.
- ▮ Vor dem Stuhl: Frösteln, Ängstlichkeit, Übelkeit, Erbrechen; starke kniefende Kolik; Rumoren im Bauch; Schwäche im Unterbauch wie Ohnmächtigkeit<sup>RA123</sup>.
  - ▮ Während des Stuhlganges: Frostschauer und Kälteschauer<sup>RA(199)</sup>; Angst, Übelkeit, Erbrechen; ohnmächtige Schwäche; Blässe<sup>RA(201)</sup>; kalter Schweiß auf der Stirn<sup>RA(210)</sup>; kniefende Kolik; Brennen im After<sup>RA130,(211)</sup> und kalter Schweiß an der Stirn; Schwäche<sup>RA(200)</sup>.
  - ▮ Nach dem Stuhl: Besserung der Nackenschmerzen; ohnmachtsähnliche Übelkeit im Oberbauch; Übelkeit, Erbrechen; Kolik; sehr flaves und leeres Gefühl im Bauch; Schwäche; ohnmächtige Schwäche; große Erschöpfung.
  - 5 ▮ Diarrhoe: mit Erbrechen trüben Wassers und kaltem Schweiß auf der Stirn; wenn der Herbst beginnt, kommt zum Durchfall noch Erbrechen hinzu und die Darmentleerungen werden in einem gewaltsamen Guß ausgestoßen, mit wenig oder ohne Kneifen, Kolik mit Schluckauf und Erstickung; Stühle unwillkürlich, wäßrig; hippokratische Gesichtszüge und kalte Glieder; Stühle häufig, heftig, sehr reichlich und schmerzhaft; große Erschöpfung nach jeder Entleerung, mit kaltem Schweiß auf der Stirn und der Haut im allgemeinen; in häufigen Anfällen, eingefallenes Gesicht, gräulich; nach nassen Füßen; schwindstüchtiger Patienten.
  - ▮ Diarrhoe nach Trinken viel kalten Wassers an einem heißen Tag; Erbrechen von Galle, mit wäßrigen, schmerzhaften Stühlen; große Präkordialangst; lang andauernde ohnmachtsähnliche Übelkeit; Haut blaß; Glieder kalt.
  - ▮ Einige diarrhoische Stühle am Tage, besonders gleich nach dem Essen; Druck im Magen nach dem Essen, < nachts, mit Übelkeit, wird zu einem schneidenden Schmerz bei Bewegung; Gefühl von Zittern im Magen; Durst.
  - ▮ Seit einigen Jahren morgens Diarrhoe, mit Zweifeln an der Erlösung.
  - ▮ Scharfe Schmerzen in der Unterbauchgegend zwei Wochen lang; am Tage sehr profuse hellbraune, wäßrige Diarrhoe, fast unwillkürlich, nach vorhergehendem scharfem Schmerz in der gleichen Gegend, > nach dem Stuhl; sehr schwach; sehr reichlicher warmer Schweiß; rotes Gesicht und Lippen; Harn vermindert.
  - 10 ▮ Diarrhoe drei Wochen lang; jeden Tag drei oder vier Stühle, manchmal mehr; Stühle dunkel, lehmfarben, ziemlich schleimig, sehr übelriechend; vor dem Stuhl, kalt im Gesicht, mit kaltem Schweiß an Gesicht und Stirn; Diarrhoe < von der Zeit des Aufstehens bis 10 Uhr morgens, danach > bis 3 Uhr nachmittags, worauf es wieder < wird; < gleich nach dem Essen; trat auf bei heißem Wetter.
  - ▮ Zehn Monate lang Mattigkeit, belegte Zunge, Unwohlsein, Übelkeit und Diarrhoe; Erbrechen zuerst von Essen, danach von gelber, bitterer Galle,

- ohne Schmerz; Stühle flüssig, kommen immer beim Erbrechen, aber auch zu anderen Zeiten; Schmerz im Unterbauch vor Diarrhoe, außer wenn sie erbricht, dann ist die Diarrhoe schmerzlos; erschöpft nach Erbrechen; nach großer Anstrengung war Schaum im Erbrochenen.
- ▮ Gleichzeitig Stuhlentleerung und Erbrechen. *θ* Cholera.
  - ▮ Plötzlicher Anfall von Diarrhoe trat auf während des Mittagessens; beim Essen plötzlich ergriffen von Kolik im Querdarm, unverzüglich gefolgt von heftigem Stuhl drang, der plötzlich herausströmte und aus dunkelbraunem, schaumigem Kot bestand.
  - ▮ Heftige Diarrhoe von Schreck; Stuhl flüssig, spritzt mit Kraft heraus; fühlt sich erschöpft; kalter Schweiß am ganzen Körper bei jedem Stuhl, aber besonders an der Stirn.
  - 15 ▮ Diarrhoe, Absonderungen weiß, erschöpfender Stuhl drang; große Erschöpfung mit Ohnmachtsanfällen.
  - ▮ Unbewußte Absonderung von dünnem Kot bei abgehenden Blähungen.<sup>RA126</sup>
  - ▮ Sechs Monate andauernde Diarrhoe; Stühle braun, schmerzlos, einer bis vier täglich, < von Handarbeit und nach Kartoffeln; Appetitsverlust; großer Durst; Gefühl, als ob etwas Lebendiges vom Magen in den Hals aufsteigen würde.
  - ▮ Hochgradiger Kollaps; Kälte der Haut; feuchtkalter Schweiß; blasses Gesicht; eingesunkene Augen; großer Durst; Erbrechen und Stuhlentleerung von fast farbloser Flüssigkeit sehr reichlich und leicht; Schmerz nicht sehr groß aber das Schwächegefühl ist intensiv. *θ* Ruhr.
  - ▮ Darmkatarrh, Diarrhoe kommt plötzlich nachts, im Sommer; Erbrechen und Durchfall.
  - 20 ▮ Brechdurchfall der Säuglinge (Cholera infantum): Anfall plötzlich; heftiges wäßriges Erbrechen und Stuhlentleerung, kalte Haut, Erschöpfung, Erbrechen ausgelöst von Trinken geringster Menge Flüssigkeit; großer Durst auf große Mengen Wasser, äußerste Schwäche; Stühle wäßrig und geruchlos; Zunge und Atem kalt; Atembeschwerden; Verlangen aufzusitzen; Bläue um die Augen; Haut scheint wie festgezogen über den Gesichtsknochen; Runzligwerden der Haut der Hände und Finger; Empfindlichkeit am Bauch.
  - ▮ Gesicht aschfarben blaß, wächsern; kalt, Augen eingesunken, mit dunklen Ringen um sie herum; Nase spitz, Lippen und Nase blau; Glieder eiskalt; Puls unfühelbar; Temperatur in der Achselhöhle 40° C.; Bauch warm, weich, obwohl aufgetrieben; die Augen sehen wild aus, rollt sie nach oben, so daß nur die Skleren zu sehen sind; Kopf rollt von einer Seite zur anderen, stöhnt ständig (Hirnhautreizung); Zunge belegt an der Basis, rein an den Lippen, trocken; Mund und Lippen ausgetrocknet; Durst ständig; sehr unruhig; > von getragen werden; Erbrechen und Würgen; er hatte seit drei Tagen nichts im Magen behalten; zwölf bis fünfzehn Stühle in vierund-



zwanzig Stunden, grün, wäßrig, herausspritzend, verändern sich zu blauer Schieferfarbe beim Stehen; Schmerzen im Bauch vor dem Stuhl, die kneifend zu sein scheinen, > nach Abgang des Stuhles; große Schwäche und Erschöpfung nach einem Stuhl, Kind liegt vollkommen schlaff; Haut trocken; Abmagerung besonders deutlich um Gesicht und Hals; Schlaflosigkeit, hatte drei Tage und Nächte nicht geschlafen; < nachts, > gegen Morgen; am nächsten Morgen ständiges Rucken und Zucken der Arme und Beine; der Kopf rollt von einer Seite zur anderen.  $\theta$  Brechdurchfall der Säuglinge (Cholera infantum).

- || Echte Cholera: < nachts; kalter Schweiß auf der Stirn; Erbrechen und Diarrhoe zur gleichen Zeit; nach Obst; mit sehr reichlichen bräunlichen Entleerungen, Durst, Krämpfen der Waden, Füße und Finger; Erschöpfung; kalter Schweiß; große Schwäche nach dem Stuhl.
- || Gebadet in kaltem Schweiß, sehr schwach und sehr verängstigt; hatte ungefähr zwei Stunden lang erbrochen und Durchfall gehabt; starke krampfartige Schmerzen durch Därme und Beine; Stühle dünn, grün und wäßrig; ständiger Durst und Trinken großer Mengen von kaltem Wasser.  $\theta$  Echte Cholera.
- || Vereinzelt auftretende (sporadische) Cholera; Blaufärbung von Händen, Gesicht und Füßen; Wadenkrämpfe; Zusammenziehen der Bauchmuskeln; große Erschöpfung; hippokratische Gesichtszüge; Erbrechen; grüne flockige Entleerungen; Körperoberfläche kalt wie Marmor (3 Fälle).
- <sup>25</sup> || Kalter Schweiß auf der Stirn; erweiterte Pupillen; Tränenfluß; Schaum vor dem Mund; Schaudern nach dem Essen; Erbrechen von Essen und grünem Schleim, bald gefolgt von scharfen wäßrigen Stühlen; große Erschöpfung; heftiges Verlangen nach Saurem; Bauch aufgetrieben; Aufschreien; Beugen der Beine auf den Bauch; Greifen nach dem Bauch; Somnolenz.
- || Zehn bis zwanzig grünliche Entleerungen in vierundzwanzig Stunden, nach vorhergehenden starken Schmerzen in der Nabelgegend, die sie aufschreien lassen; Schweiß am ganzen Körper; Bauch schmerzhaft bei Berührung, aber nicht gedunsen; Oberbauch und re. Hypochondrium gespannt, empfindlich gegen Druck; bitteres Erbrechen von Flüssigkeit, die vorher zu sich genommen worden war; Mund trocken, gelber Belag auf der Zunge, feucht; Heiserkeit; Ohrenklingen; Schwindel; Wadenkrämpfe; Haut kühl; nach Erkältung und Schreck.
- || Verzerrter hippokratischer Gesichtsausdruck, ständiger Schluckauf, ängstliches, unruhiges Umherwerfen; Krampfen der Hände und Füße; Schmerzen im Bauch; spricht nicht; starkes Würgen mit Erbrechen gelblicher Flüssigkeit, < nach Trinken; Stühle wäßrig, gehen unbewußt ab; Körperoberfläche kalt; Gesicht gebadet in kaltem Schweiß.  $\theta$  Vereinzelt auftretende (sporadische) Cholera.

- II Asiatische Cholera: große Erschlaffung des vegetativen Systems ohne irgendeine große geistige oder sensorische Störung; geringe seelische Depression; Furcht vor dem Tode oder Gleichgültigkeit; Schwindel; ungestüme Entleerung nach oben und nach unten; Eiseskälte des Körpers; große Schwäche; Wadenkrämpfe; Erbrechen mit ständigem Verlangen nach kalten Getränken; reichliche, wäßrige, geruchlose Stühle, gemischt mit weißen Flocken; Gesicht blaß, ohne jegliche Farbe oder bläulich; dunkle Ränder um die Augen; Todesangst im Gesicht; kalte Zunge und Atem; heisere, schwache Stimme; beklemmende große Angst in der Brust, so daß der Patient aus dem Bett fliehen möchte; heftige Kolik, besonders um den Nabel, als ob der Bauch aufgerissen würde; Bauch empfindlich gegen Berührung mit Ziehen und Krämpfen in den Fingern; runzlige Haut in den Handflächen; Harnverhaltung.
- II Sehr reichliche Reiswasserstühle alle fünfzehn bis zwanzig Minuten, mit leichtem Brennen im After; häufiges wäßriges Erbrechen, besonders nach Trinken; sehr großer Durst auf kaltes Getränk; Nase und Ohren eiskalt, Körper und Glieder ziemlich warm; Frösteln bei Bewegung; Zunge feucht, schwach belegt; weicher, beschleunigter Puls; trockene Haut; heftige tonische Krämpfe in Waden, Oberschenkeln und Kaumuskeln treten nach Erbrechen oder Durchfall auf. *θ* Cholera.
- <sup>30</sup> II Erbrechen und Stuhlentleerung; Stühle wäßrig, flockig; starkes Brennen im Oberbauch; großes Verlangen nach kaltem Wasser; starke Krämpfe in den Waden; große Präkordialangst; Gesicht blaß, ängstlich; Puls klein, häufig; weiß belegte Zunge. *θ* Cholera.
- II Plötzliches Erbrechen und Diarrhoe; ängstlicher, verstörter Gesichtsausdruck; Augen eingesunken, umgeben von dunklen Ringe; Hauttemperatur des Körpers leicht erhöht, Glieder kalt; Haut trocken; Puls schwach, 130; großer Durst aber erbricht unmittelbar die in den Magen gelangten Flüssigkeiten; wäßrige Stühle alle halbe Stunde; anfallweise Wadenkrämpfe, mit Umherwerfen und Weinen. *θ* Cholera.
- II Erbrechen und Diarrhoe; sehr kalte Haut; ständige Übelkeit; wäßriges Erbrechen beim Bewegen oder Trinken; wäßrige Stuhlentleerung; großer Durst; Puls klein; Zunge weiß; Haut warm; keine Krämpfe. *θ* Cholera.
- II Reiswasserstühle; Erbrechen; Augen eingesunken, umgeben von dunklen Ringen; Zunge weiß; Gesicht blaß; Puls schnell, schwach. *θ* Cholera.
- II Schwäche grenzend an tiefe Ohnmacht (Synkope); kalter Schweiß; sehr schneller, leerer, schwacher Puls; Stühle locker, ganz weiß, wie Stärkelösung, gingen ab mit ermüdender Anstrengung und wurden gefolgt von außerordentlicher Erschöpfung und Schwinden der Sinne; keine Übelkeit oder Erbrechen.
- <sup>35</sup> Erfolgloser Stuhl drang.
- II Verstopfung wegen Härte und großem Umfang der Stühle.<sup>RA131</sup> *θ* Lähmung.

- ! Verstopfung: chronisch, Stühle massig und hart, oder der erste Teil hart, der letzte Teil weniger dick; Stühle in runden schwarzen Kugeln; chronisch, bei Kindern; wie von Trägheit des Rektums<sup>RA132+</sup>; bei kaltem Wetter; der Säuglinge; bei Hypochondrikern und Wahnsinnigen.
- || Hartnäckige Verstopfung; bitteres, saures Aufstoßen, Völle in Magen und Därmen nach dem Essen; Schmerz in der Lebergegend; Ausschlag am Körper.
- ! Verstopfung der Säuglinge nach *Nux vom.* oder *Lycopodium.*
- 40
  - Vor verstopftem Stuhl: kein Drang; der Stuhldrang wird im Oberbauch gespürt; Druck zum After, mit blinden Hämorrhoiden<sup>RA139</sup>; Tenesmus.
  - ! Während verstopftem Stuhl: große Anstrengung; kalter Schweiß auf der Stirn; Hitze im After; schmerzlose Absonderung von massenweise Blut in Klumpen, mit Gefühl von Flaueit.
  - ! Nach verstopftem Stuhl: Schwäche oder Erschöpfung. Kotmasse abgeflacht und dünn wie ein Band.
  - ! Hämorrhoiden bei Krankheiten der Lungen oder des Brustfells; schmerzlose Absonderung von massenweise Blut in Klumpen, mit Gefühl von Flaueit; Zerschlagenheitsgefühl in der Kreuzbeingegend.
- 45
  - ! Anfälle von Erbrechen und Stuhlentleerung, mit kaltem Schweiß an der Stirn und Symptomen von Würmern.
  - || Bandwurm.
- 21
  - Harnorgane.** Ununterbrochener Harndrang.
  - Häufiges Urinieren, mit heftigem Durst und Hunger.<sup>RA(128)</sup>
  - ! Harn: spärlich, rotbraun oder unterdrückt; grünlich.
  - ! Unwillkürliches Urinieren<sup>RA(215)</sup>, während des Hustens<sup>RA(261)+</sup>, auch während Typhus<sup>↑</sup>.
- 5
  - || Harn dick bei der Entleerung und sehr dunkel, manchmal fast schwarz; kalte Schweiß von Zeit zu Zeit; Essen hat keinen Geschmack; Rauchen macht den Hals trocken und er genießt es nicht; heftiges Verlangen nach Essen; Übelkeit beim Essen, kann das Essen nicht hinunterkriegen ohne Würgen; Zunge weiß.
- 23
  - Weibliche Geschlechtsorgane.** ! Nymphomanie: vor den Menses; von unbefriedigter Leidenschaft oder psychischen Ursachen; Kindbettpsychose; heftig und zerstörerisch, geschwätzig; von unglücklicher Liebe; während der Entbindung.
  - ! Gebärmutterentzündung mit Anfällen von Erbrechen, Delirium, Angst und Diarrhoe; Körper heiß, Glieder kalt.
  - || Hatte eine Fehlgeburt vier Monate nach der Heirat, überschwemmende Gebärmutterblutung und heftige Gebärmutter Schmerzen, nachfolgend große Schwäche; blasses Gesicht; Augen eingesunken mit einem stumpfen Ausdruck, der großes Leiden verriet; Glieder kühl; heftige Gebärmutter Schmerzen, stechend, besonders an der Rückwand der Gebärmutter; Herz-

klopfen weist auf den vergrößerten Umfang der Gebärmutter hin, die hart und berührungsempfindlich ist; die Untersuchung verrät Blutandrang zum Gebärmutterhals, der hart ist und von vorn nach hinten etwas abgeflacht erscheint; leichteste Berührung läßt die Patientin aufschreien; kann nicht aufstehen wegen des Schmerzes, der davon erzeugt wird; gänzlicher Appetitsverlust; schleimige diarrhoische Stühle; ständig kalt, besonders in den Gliedern.  $\theta$  Gebärmutterentzündung.

11 Chronische Gebärmutterkrankheit, < nachts, danach kalter Schweiß; am Morgen, Erbrechen von schaumigem Schleim.

5 1 Menses: zu früh, zu profus; unterdrückt, mit Zweifeln an der Erlösung oder mit Blutspucken; sehr erschöpfend.

Vor den Menses: Kopfschmerz, Schwindel, Nasenbluten<sup>RA(221)</sup>, Nachtschweiß<sup>RA(224)</sup>.

Während der Menses: morgens Kopfschmerz, Übelkeit, Ohrenklingen, Durst und Schmerzen in allen Gliedern<sup>RA(225)</sup>.

Am Ende der Menses: Zähneknirschen und bläuliches Gesicht.<sup>RA(226)</sup>

1 Menorrhagie mit Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe, kaltem Schweiß auf der Stirn und schwachem Puls.

10 1 Dysmenorrhoe: bei Vorfall; Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe, Erschöpfung; kalter Schweiß; Kälte des Körpers; mit Frösteln; mit Schmerz in den Nieren und der Gebärmutter vor und während der Menses.

11 Seit drei Monaten, beim Erwachen Übelkeit, Erbrechen und zusammenschnürendes Gefühl im Hals; Dumpfheit im Kopf, manchmal Gefühl, als läge ein Stück Eis auf dem Scheitel; häufiges Frösteln, kann kaum warm werden, Füße, Hände und Nase eiskalt; Monatsblutung unregelmäßig, im allgemeinen alle drei Wochen; früh am Tage, an dem die Menses erscheinen, Diarrhoe, Übelkeit, Frösteln, vier bis sechs wäßrige Entleerungen mit brennendem Schmerz im Rektum; Reizbarkeit; empfindlich, wird zornig über Kleinigkeiten oder weint wegen Kleinigkeiten.

11 Ein Mädchen, 19 Jahre alt, erkrankt seit mehreren Jahren; fast ständiger Kopfschmerz; spärliche und verspätete Menses; vor einigen Monaten plötzlich befallen von Hämophthalmus ungefähr sechs oder acht Tag vor der Menstruationsperiode, jeden Nachmittag gegen Sonnenuntergang, vermehrt als die Nacht eintrat; konnte danach nichts sehen, konnte deshalb nicht ins Freie gehen, konnte Gegenstände nicht erkennen, nur wenn sie ganz in der Nähe vom Kerzenlicht waren; auch am Morgen eine halbe Stunde lang nach dem Erwachen, Sicht unzureichend; Schwindel, wie bekommen im Kopf, als ob alles Blut in den Kopf steigen würde; Menses wie gewöhnlich etwa zwei oder drei Wochen verspätet, als sie schließlich kamen, wurde sie so häufig wie zuvor von Erbrechen und Diarrhoe befallen, das anhielt bis der Fluß vollkommen eingesetzt hatte; ein andermal verstopft, Stuhl nur alle drei Tage in runden, harten, schwarzen Klumpen; mo-

- natlicher Fluß immer spärlich, teilweise flüssig, teilweise klumpig; dauerte niemals länger als zwei Tage; während der Periode Kopfschmerz viel stärker; fühlte sich so schwach, daß sie sich hinlegen mußte.
- ! Amenorrhoe, mit nervösem Kopfschmerz, bleierner Gesichtsfarbe, Übelkeit, Erbrechen und Diarrhoe.
  - ! Abgeschnürter Scheidenvorfall, mit kaltem Schweiß, erschöpfendem Erbrechen und Diarrhoe.
- 24 **Schwangerschaft. Entbindung. Stillperiode.** ! Drohende Fehlgeburt; Schmerzen, mit kaltem Schweiß, Übelkeit und Erbrechen.
- ! Während der Schwangerschaft: möchte im Haus herumgehen; schweigsam; hochmütig; durstig; Erbrechen; möchte alles kalt genießen; heftiges Verlangen nach Säuren und salzigem Essen; Heißhunger; fühlt sich sehr schwach und matt; Krampf in den Gliedern, mit kaltem Schweiß; Härte des Kotes und Inaktivität des Rektums.
  - || Erbrechen während der Schwangerschaft seit vier Monaten; fühlt sich ständig kalt an; Füße eiskalt; zuweilen Hitzewallungen mit Durst; nach Essen, Druck im Magen; Schluckauf, Würgen, Wasseraufschwulken, bitterer Geschmack im Munde; schneidende Schmerzen im Bauch; reißende Schmerzen in den Beinen; Mattigkeit und Erschöpfung.
  - ! Verlangt Obst und saftige Sachen.
- 5 ! Die Wehen erschöpfen sie; Ohnmacht bei geringster Bewegung; kalter Schweiß.
- ! Wochenfluß unterdrückt, mit Nymphomanie.
  - ! Im Kindbett: unverschämtes Betragen; Nymphomanie; Erschöpfung.
  - ! Kindbettpsychose, möchte jeden küssen; religiös; zweifelt an ihrer Erlösung.
  - ! Eklampsie während der Entbindung; Blässe, Kollaps, Anämie oder heftige Hirnkongestion, mit gedunsenem Gesicht, wildem Aufschreien, Zerreißen der Kleidung.
- 10 Schmerzhaftigkeit der Brüste.  
Unterdrückung der Milch.
- 25 **Kehlkopf und Stimme. Luftröhre und Bronchien.** || Stimme schwach, hohl, heiser, rau. *θ* Cholera.
- ! Stimmritzenkrampf.
  - ! Anfälle von Zusammenschnüren des Kehlkopfes<sup>RA(238)</sup>; Erstickungsanfälle, mit vorstehenden Augen.<sup>RA162</sup>
- Krampfhaftige Kontraktion der Stimmritze mit verengten Pupillen.
- 5 || Erwacht plötzlich aus dem Schlafe auf mit einer langen, rauhen, krächzenden Einatmung, dauert vier bis sechs Sekunden, keine Ausatmung folgt, die Atmung hört vierzig bis sechzig Sekunden lang auf, das Gesicht wird blau und bedeckt mit kaltem Schweiß; Augen vorstehend, starrend; Mund weit geöffnet, Brustkorb aufgetrieben, Herzschläge normal; schließlich fängt das Kind an die Arme und Beine herumzuwerfen, die in kaltem Schweiß geba-

- det sind und es kommt zu einer langen, lauten Ausatmung, die wie ein Seufzen klingt und die Atmung ist wiederhergestellt; Diarrhoe; Bauch aufgetrieben; Abmagerung; schreit häufig im Schlaf.  $\theta$  Stimmritzenkrampf (Spasmus glottidis).
- 11 Erwacht plötzlich aus dem Schlafe mit einem pfeifenden Schrei, Erstickung scheint zu drohen, das Gesicht wird zyanotisch, erlangt seinen Atem wieder nach einigen Minuten; Anfälle werden auch ausgelöst von Weinen.  $\theta$  Spasmus glottidis.
- Kitzeln sehr tief unten in der Luftröhre, erregt Husten, ohne Auswurf.
- 11 Kehlkopf-Luftröhrenkatarrh (Laryngo-tracheitis), Husten übermäßig anstrengend und schüttelnd, gestattet Tag und Nacht keine Ruhe, mit Schmerzen in Kopf, Brust und Bauch von der Erschütterung.
- 1 Große Schwäche bei leichten katarrhalischen Symptomen.  $\theta$  Grippe während der Cholerazeit.
- 10 1 Kapillarbronchitis; blaues Gesicht; Ödem der Lungen und große Furcht vor Erstickung.
- 1 Bronchitis, besonders alter Leute; ständiges Schleimrasseln ohne auswerfen zu können; Erschöpfung, häufiger, unregelmäßiger Puls und klebriger Schweiß im Kopfgebiet.
- 26 **Atmung.** 1 Atmung schwach, unterbrochen.
- 1 Kurzatmigkeit bei leichter Bewegung, sogar im Hause; > wenn er sitzt.<sup>RA160</sup>
- Äußerst erschwerte und quälende Atmung<sup>RA(233)</sup>; scheint in Gefahr zu ersticken<sup>RA(237)</sup>.
- Sehr große Angst hält die Atmung an<sup>RA177</sup>, mit Verlangen aufzusitzen oder aus dem Bett zu springen.
- 5 Brustbeklemmung beim Husten.<sup>RA159</sup>
- 1 Zusammenziehender Brustkrampf.<sup>RA166-67</sup>
- 1 Asthma: bei naßkaltem Wetter; am frühen Morgen; > von Zurückwerfen des Kopfes; Neigung sich zu bewegen; kalter Schweiß am Oberkörper und den Gliedern; chronische Fälle.
- 11 Kalter Atem.  $\theta$  Cholera.
- 27 **Husten.** Husten: trocken, kitzelnd nach Gehen in scharfer, kalter Luft; trocken, krampfartig, rasselnd, aber nichts löst sich; tief, hohl, schallend, keuchend, ausgelöst von Kitzeln in den untersten Bronchialästen<sup>RA156+</sup>, Auswurf von gelbem, zähem, klebrigem Schleim von bitterem, salzigem, saurem oder faulem Geschmack; krampfhaft, mit Zyanose, kaltem Schweiß; mit Blutspucken; nach großer Anstrengung; laut bellend, bei Hysterie; hohl, stoßweise, mit schneidendem Schmerz im Bauch; mit blauem Gesicht, mit unwillkürlichem Urinieren; < morgens und spät abends bis 12 Uhr nachts; beim Gehen in ein warmes Zimmer; beim Warmwerden im Bett; < bei Wetterwechsel; von kalte Sachen essen oder trinken, besonders Wasser, mit Weinen und Ärger.

- || Krampfhafter Husten mit starkem Brennen und Trockenheit im Mund und Rachen; langanhaltende Schlaflosigkeit; Angst in der Präkordialgegend; Reizbarkeit der Sinne.  $\theta$  Masern.
- || Baby, Haut sehr heiß; kalter Schweiß auf der Stirn beim Husten; Augen halbgeöffnet im Schlaf.
- || Kitzeln mit Gefühl von Zusammenschnüren im Halse; Beklemmung, Übelkeit, Erbrechen von Essen und Schleim nach dem Husten.
- 5 || Keuchhusten: Krampfstadium; große Erschöpfung, Kinder können nach einem Anfall nicht wieder zu Kräften kommen, neigen dazu ihren Kopf gegen etwas anzulehnen, um ihn zu stützen; Fieber, mit kaltem Schweiß, besonders an der Stirn; großer Durst; kleiner schneller Puls; Harnfluß beim Husten; Husten hört auf beim Hinlegen und kehrt wieder beim Aufstehen; Anfälle herbeigeführt durch Eintreten in ein warmes Zimmer oder Trinken kalten Wassers; Gesicht blaß und eingefallen; Unruhe und Angst; Erbrechen von zähem, dünnem Schleim.  $\theta$  Herbst- und Frühlingsepidemie.
- 28 **Innere Brust und Lungen.** || Zusammenschnürung der Brust. Drücken in Gegend des Brustbeines nach Essen und Trinken.<sup>RA170</sup>
  - || Ständiges Rasseln von Schleim, kann jedoch nicht auswerfen; klebriger Schweiß im Kopfgebiet; schwach; häufiger unregelmäßiger Puls; Bronchitis alter Leute.
  - || Kapillarbronchitis; fahles Gesicht, blaue Nägel, kalte Glieder und ungestüme, unregelmäßige Kontraktionen des Herzens; kalter Schweiß auf der Stirn beim Husten; Augen halbgeöffnet im Schlaf.
  - 5 || Akuter Bronchialkatarrh bei emphysematösen Personen.
    - || Rasseln in den Lungen, Erstickungsangst; schaumiger, seröser Auswurf; blaues Gesicht; Ödem der Lungen.
    - Stiche innen in der Brust.<sup>RA(64)-</sup>
    - || Kruppöse Lungenentzündung; Lungenentzündung, die unvermutet bei Keuchhusten auftritt.
- Zwerchfellentzündung und Peritonitis mit Erbrechen.
- 29 **Herz, Kreislauf und Puls.** || Starkes Herzklopfen bei Chorea.
  - || Heftiges, sichtbares ängstliches Herzklopfen mit Ohnmacht.
  - || Ungestüme unregelmäßige Kontraktionen des Herzens, als Vorläufer einer Lähmung.  $\theta$  Kapillarbronchitis.
  - || Intermittierende Herzstätigkeit bei schwachen Personen mit etwas Behinderung der Leberzirkulation.
  - 5 || Herzklopfen bei anämischen Personen; nervös; tödliche Angst, Beine kalt; Atembeschwerden; > in der Ruhe oder von Hinlegen; mit Angst und schneller hörbarer Atmung; nachts; mit Erschöpfung oder Ohnmacht; treibt aus dem Bett.
  - || Angina pectoris; periodisch auftretende Schmerzanfälle in der li. Brustseite, oder Schneiden mit sehr großer Todesangst, erstreckt sich zu den Schultern;

allgemeine Erschöpfung, Haut kalt und klamm; Atembeschwerden; erstikendes Zusammenschnüren der Brust so quälend, daß er vor Todesangst schwitzt; allgemeine Erschöpfung; Krämpfe in den Gliedern; Haut kalt und klamm.

- ▮ Puls: häufig, klein, hart; langsam, weich, intermittierend; langsamer als der Herzschlag; sehr klein unregelmäßig; unwahrnehmbar<sup>RA(311)</sup>.
- ▮ Das Blut läuft wie kaltes Wasser durch die Venen.
- Starke Aktivität des arteriellen Systems.
- 31 **Nacken und Rücken.** Muskeln des Nackens scheinen gelähmt.
- ▮ Nacken zu schwach um den Kopf aufrecht zu halten.<sup>RA179</sup> *θ* Keuchhusten.
- ▮ Ständiger Schmerz in den Schultern seit zehn Jahren, erstreckt sich von dort zum Hinterkopf und den Armen, < von Bewegung und bei feuchtem Wetter. *θ* Muskelschmerzen.
- Rheumatismus zwischen den Schulterblättern, ausgehend vom Nacken zum Kreuz<sup>RA185+</sup>; Brennen an der Wirbelsäule entlang.
- 5 ▮ Myelitis; schmerzhaft, lähmungsartige Schwäche in Armen und Beinen; Kribbeln in den Fingern, erzeugt Angst; schmerzhaft ruckartige Zuckungen in den Gliedern; elektrische ruckartige Schocks in den Gliedern, > im Bett, setzt sich auf mit den Beinen aus dem Bett hängend oder muß herumlaufen.
- Zerschlagenheitsgefühl in der Kreuzbeingegend.<sup>RA(269)</sup>
- 32 **Arme.** Neuralgie in Armplexus (Plexus brachialis) wie zerschlagen oder gequetscht.<sup>RA193-</sup>
- ▮ Aufgeweckt aus dem Schlafe jeden Morgen um 4 oder 5 Uhr von starken, unbeschreiblichen Schmerzen in den Armen; sie fühlen sich wie zerschlagen oder gebrochen an, die Schmerzen erstrecken sich von der Schulter zum Handgelenk, kann kaum den Arm bewegen; der Schmerz hält an solange er im Bett liegt, kann kein Zudecken vertragen; < beim Aufstehen und Umhergehen; Zittern des Armes den übrigen Tag, besonders des linken; < in schlechtem Wetter, Frühling und Herbst; seit drei Jahren. *θ* Neuralgie im Plexus brachialis.
- Arme fühlen sich kalt an beim Heben derselben; fühlen sich wie zu voll und geschwollen an.<sup>RA195-96</sup>
- Der Arm zittert, wenn etwas ergriffen wird.<sup>RA198</sup>
- 5 ▮ Schmerz in der Mitte des li. Unterarmes, als würden die Knochen gedrückt.<sup>RA197</sup>
- ▮ Kribbeln in Händen und Fingern, verursacht Angst.<sup>RA202-04</sup> *θ* Myelitis.
- ▮ Kribbeln in den Händen, als wären sie eingeschlafen gewesen.
- ▮ Hände eiskalt, blau.
- ▮ Faltigwerden der Haut der Hände und Finger. *θ* Cholera.
- 33 **Beine.** ▮ Heftiger Hüftschmerz tritt jeden Morgen um 4 Uhr auf.



II Reißender Schmerz im li. Bein vom Oberschenkel zu den Zehen; häufige Schocks darin; Bein berührungsempfindlich, ein anderes Mal kalt und empfindungslos; häufige Unruhe des Beines; Schmerz < nachts nachdem man eine Weile im Bett ist, muß aufstehen und das Bein an der Seite des Bettes hängenlassen oder herumlaufen; re. Bein auch betroffen, aber in geringem Maße.

Schocks in der re. Hüfte.

II Elektrische ruckartige Zuckungen in den Gliedern<sup>RA(298)+</sup>; < im Bett, muß sich aufsetzen und die Beine aus dem Bett hängenlassen oder muß herumlaufen; Rheumatismus.  $\theta$  Myelitis.

5 Gehen sehr schwierig; wie Lähmung, wechselt von der re. zur li. Hüfte (oder bei Patienten auch von li. nach rechts).

II Gliederzittern<sup>RA(301)+</sup>; Krämpfe; große Schwäche danach.

II Vollständige Erschöpfung der Muskeln; schnell sinkende Kräfte; sinkt vollständig erschöpft nieder; starke Blässe des Gesichtes.

Heftige Krämpfe in den Gliedern.

II Bei nassem Wetter Schmerzen in den Beinen, < Bettwärme, > beim auf und ab Gehen.

10 II Beine steif am Vormittag und beim Stehen; Rheumatismus; abwechselnd heiß und kalt, Kopf heiß; kalt.

Schmerz in den Schienbeinen wie zerbrochen.

II Wadenkrämpfe.  $\theta$  Cholera.

II Schmerzen in den Füßen, besonders den Knien, als ob schwere Steine an den Teilen festgebunden wären<sup>RA(290)</sup>; muß umhergehen zur Erleichterung.

Plötzliche Schwellung der Füße; sie sind kalt und ödematös.

15 II Füße eiskalt.

II Sehr kalte Füße, bei Kolik.

Vorübergehendes schmerzendes Stechen in den Zehen des re. Fußes, beim Stehen.<sup>RA(287)</sup>

34 **Glieder allgemein.** I Glieder schlafen ein, auch beim Hinlegen.

II Schmerzhafte lähmungsartige Schwäche in den Gliedern.

I Lähmung der Glieder.

I Gliederschmerzen, wie erschöpft von sehr großer Müdigkeit.

5 I Gliederschmerzen, < in nassem kaltem Wetter; < in Bettwärme; > beim Hin- und Hergehen.

I Nägel blau von der Kälte.

35 **Ruhe, Lage und Bewegung.** In der Ruhe: Herzklopfen >.

Horizontale Lage: Erbrechen >; fühlt sich vergleichsweise wohl.

Liegen: Husten hört auf; Herzklopfen >; Glieder schlafen ein.

Sitzen: still, Atmung >; mit den Beine aus dem Bett hängend, bei Myelitis, ruckartige Zuckungen in den Gliedern.

5 Bücken: Kopfschmerzen <; Blutandrang zum Kopf.

Stehen: Steifheit in den Beinen; schmerzendes Stechen in den Zehen des re. Fußes.

Bewegung: Kopfschmerzen <; geringste, verursacht Übelkeit und Erbrechen; schneidender Schmerz im Magen <; Kurzatmigkeit; neigt zu, bei Asthma; Neuralgie in den Armen <; Schwäche <.

Aufstehen: kleine schwarze Punkte oder Flecken vor den Augen; Husten <.

Verlangen aufzusitzen oder aus dem Bett zu springen: Asthma.

<sup>10</sup> Rennt zusammengekrümmt herum: Darmeinstülpung.

Den Kopf heben: verursacht Erbrechen.

Heben der Arme: sie fühlen sich kalt an.

Handarbeit: Diarrhoe <.

Zurückwerfen des Kopfes: Asthma >.

<sup>15</sup> Etwas Ergreifen: Arm zittert.

Treibt aus dem Bett: Herzklopfen; ruckartige Zuckungen in den Gliedern, bei Myelitis.

Nach Aufstehen aus dem Bett: Frost >.

Gehen: muß herumlaufen um die ruckartigen Zuckungen in den Gliedern zu >; Neuralgie in den Armen <; Neuralgie in den Beinen <; sehr schwierig, wie Lähmung in der Hüfte; < die Schmerzen in den Füßen und Knien.

Anstrengung: geringste, verursacht Ohnmacht; verursacht Husten; verursacht Schweiß.

<sup>36</sup> **Nerven.** || Nervös, als müsse sie wegfliegen.

■ Ohnmächtige Schwäche; fällt in Ohnmacht von geringster Anstrengung oder von leichtem Schmerz.

■ Schnell sinkende Kräfte; gänzliche Erschöpfung; kalter Schweiß und kalter Atem; Kollaps.

■ Allgemeine Schwäche mit blauen Händen und kalten Füßen.

<sup>5</sup> || Äußerste Schwäche; muß sich sehr langsam bewegen; so schwach, daß sie kaum ihre Hand heben kann und jede Bewegung scheint die Schwäche zu verstärken; sogar ein Stuhlgang verursacht große Schwäche; sehr schwacher, fast un wahrnehmbarer Puls; kalter Schweiß, besonders an der Stirn; Durst auf eiskaltes Wasser.

■ Plötzliches Sinken der Kräfte.

■ Äußerste Schwäche nach Mißbrauch von Chinin.

|| Kind schwach mit einer Art von Schwindsucht. *θ* Keuchhusten.

■ Muß sich hinlegen; große Angst; kalter Schweiß auf der Stirn, wenn er aufsteht.

<sup>10</sup> || Hochgradiger Kollaps, Kälte der Haut, feuchtkalter Schweiß, blasses Gesicht, eingesunkene Augen, großer Durst, Erbrechen und Durchfall von fast farbloser Flüssigkeit; Gefühl großer Schwäche.

■ Chronische Schwäche; Zittern des ganzen Körpers<sup>RA305</sup>.

■ Zittern; ruckartiges Zucken; Krämpfe; Konvulsionen<sup>RA(299)</sup>.

Tetanische Steifheit des Körpers.

- ▮ Konvulsionen: im Kindbett; herrührend von religiöser Erregung; hysterische; der Kinder; Angst, blasses Gesicht, kalter Schweiß auf der Stirn; Husten vor oder danach; tiefe Ohnmacht (Synkope) nach den Krämpfen; mit Zyanose.
- 15 ▮ Tonische Krämpfe mit Kontraktion der Handflächen und Fußsohlen.
- 11 Kann sich nicht anziehen; ständiges Zucken und alberne Bewegungen; die Beine zucken sogar im Schlaf; kann nicht gehen; erbricht das Essen; weint wegen geringster Kleinigkeiten.
- 11 Eiskalt; Atem kalt; Zunge kalt; große Schwäche; verzerrtes Gesicht; Gesicht drückt Entsetzen aus. *θ* Unfallschock.
- ▮ Lähmung; nach Cholera; von schwächenden Säfteverlusten.
- 37 **Schlaf.** Gähnen.<sup>RA283</sup>  
Schläfrigkeit.  
11 Ununterbrochener Schlaf drei Tage lang.<sup>RA(320)+</sup> Typhus<sup>1</sup>.  
Schläfrig, fährt auf wie vor Schreck, verhindert den Schlaf; Fieber folgt.
- 5 Arme über den Kopf ausgestreckt, stöhnt im Schlaf.<sup>RA278,279-</sup>  
Nachts Angst und Schlaflosigkeit.  
Träume: von Ertränktwerden; wird gebissen von einem Hund und kann nicht fliehen<sup>RA(326)</sup>; von Gejagtwerden<sup>RA281</sup>; von Räubern, mit verängstigtem Erwachen und einer Wahnvorstellung, daß der Traum wahr sei<sup>RA280</sup>.
- 38 **Tageszeit.** 4 Uhr morgens: Aufstoßen.  
Gegen Morgen: Kopfschmerz >; Diarrhoe >.  
Morgens: konnte die Augen nicht öffnen; Lider schienen am Augapfel zu kleben; Diarrhoe; Rucken und Zucken der Glieder; Kopfschmerz während der Menses; Asthma; Husten <; Schweiß; Frost.  
Vormittags: Steifheit in den Beinen.
- 5 Von der Zeit des Aufstehens bis 10 Uhr morgens: Diarrhoe <.  
Von 10 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags: Diarrhoe >.  
Nachmittags: Bauchkneifen.  
3 bis 9 Uhr abends: Neuralgie der Därme.  
4 Uhr nachmittags: Neuralgie der Därme.
- 10 5 Uhr nachmittags: Kopfschmerz auf dem Scheitel.  
Abends: Angst; remittierendes Fieber <; spät abends, Husten <; Hitze; Schweiß.  
Nachts: Fluchen und Heulen; Stöhnen und Seufzen; Kopfschmerz, der am Nachmittag beginnt; im Schlaf Nasenbluten; Delirium, remittierendes Fieber; Druck im Magen <; im Sommer plötzliche Diarrhoe; echte Cholera <; Gebärmuttererkrankung <; Hämophthalmus; Herzklopfen: Schweiß.
- 39 **Temperatur und Wetter.** Im Freien: nach körperlicher Bewegung, Heißhunger (Bulimie).

<sup>1</sup> engl. typhoid fever, s. unsere Typhus-Fußnote in STRAMON, 1

- Wärme: > nicht die Gesichtsneuralgie; des Bettes, Husten <; des Bettes, Neuralgie im Bein <.
- Warmes Zimmer: Hineingehen in, Husten <.
- Heißer Tag: Trinken kalten Wassers verursacht Diarrhoe.
- 5 Heißes Wetter: Diarrhoe; Scharlach.
- Kälte: kaltes Essen und Trinken, Husten <.
- In scharfer, kalter Luft: trockener Kitzelhusten.
- Naßkaltes Wetter: rheumatische Augenentzündung; Asthma.
- Feuchtes Wetter: Neuralgie im Gesicht.
- 10 Regenwetter: Schmerzen in den Gliedern.
- Schlechtes Wetter: Neuralgie in den Armen.
- Wetterwechsel: Husten <.
- 40 **Fieber.** Frost und Kälte: am meisten äußerlich, mit innerer Hitze und feuchtkaltem Schweiß; läuft nach unten; Schüttelfrost mit Schweiß, der schnell in allgemeine Kälte übergeht; der Säuglinge; mit Verlangen nach kalten Getränken.
- Frost verstärkt von Trinken; > nach aus dem Bett aufstehen.
- || Der ganze Körper eiskalt.<sup>RA289,(328-30)</sup>
- Frost und Hitze abwechselnd, bald hier, bald dort, an einzelnen Teilen.
- 5 || Inneres Kältegefühl läuft vom Kopf zu den Zehen.<sup>RA(331)</sup>
- || Kalte Haut; kalter, klammer Schweiß.
- || Gesicht kalt, kollabiert.
- || Kälte über den Rücken.
- || Glieder kalt.
- 10 || Hitze: des Kopfes; und Röte des Gesichtes<sup>RA292+</sup>; am meisten innere, mit Durst, aber kein Verlangen zu trinken<sup>RA(344)-</sup>; am Abend, mit Schweiß; steigt an; im Wechsel mit Frösteln.
- || Schweiß: sehr reichlich; morgens, abends oder die ganze Nacht; bei jedem Stuhl; feuchtkalt; übelriechend; bitter riechend<sup>RA(349)</sup>; macht gelbe Flecken; mit totenblassem Gesicht; allgemein, kalt, < an der Stirn<sup>RA(351)</sup>; von geringster Anstrengung.
- || Wechselfieber, häufig perniziöses, während der Cholera; auch nach Mißbrauch von Chinin.
- || Quotidianfieber, Frost dauert eine Stunde, mit blauen Nägeln, danach Hitze gemischt mit Frösteln, schließlich allgemeiner sehr reichlicher kalter Schweiß; Durst im Fieber und besonders während des Schweißes; Übelkeit; bitteres Erbrechen; Diarrhoe; Harn dunkel, lagert ein ziegelrotes Sediment ab.
- || Einige Frostschauer jeden zweiten Tag; der Frost fing an mit Kälte im Bauch, breitete sich von dort im ganzen Körper aus; häufige Stühle, dünn und wäßrig; die Kälte wurde allgemein, aber kein Schütteln; Atem beklemmt und mühsam; die Stühle wurden blutig, schließlich lief nichts außer reinem Blut

stetig aus den Därmen; Erbrechen von Blut, eine Zeitlang war das Blut dünn und hellrot, später dunkel und dick; Erschöpfung sehr groß; Sprachlosigkeit; der Frost dauerte acht Stunden und der Patient(in) schien im Begriff zu sterben.

- 15 **II** Ein Knabe, 12 Jahre alt, hatte seit zwei Monaten Wechselfieber gehabt; zuerst Frost jeden zweiten, jetzt jeden Tag, der abwechselnd schwach und stark ist; Kälteschauer mit Durst eine halbe Stunde lang, gefolgt von Hitze, die einige Stunden anhält, mit trockenem Husten und Kopfschmerz; Schweiß sehr reichlich mit Durst; kurz nachdem der Frost einsetzt, schläft der Patient ein; während des Hitzestadiums verwandelt sich der Schlaf in ein Koma, aus dem er zuweilen erwacht und um Getränk bittet; während der ganzen Unterbrechung schläft und trinkt eine ganze Menge, aber hat wenig Appetit.
- Wechselfieber, das frühmorgens auftritt.
  - II Nach dem Frost keine Hitze, jedoch Schweiß.
  - Perniziöses Wechselfieber; Kollaps während des Frostes.
  - Gallenfieber; Magenkrämpfe; Verstopfung; Kolik; Niedergeschlagenheit; Verzweiflung.
- 20 **I** Rheumatisches Fieber mit sehr reichlichem Schweiß, großer Schwäche, Diarrhoe.
- II** Typhoide Fieberarten, besonders in der Cholerazeit; auch wenn die Lebenskraft plötzlich sinkt; kalter Schweiß<sup>RA288</sup>; Koma; Erbrechen und wäßrige Diarrhoe; bläuliches Gesicht; spitze Nase; faltige Haut.
- II Ein Knabe, 5 Jahre alt, lag auf der re. Seite; erregt, geschwätzig; antwortete manchmal klar, dann wieder ohne Beziehung zur Frage; deliröses Sprechen oder Stöhnen; stieß das Bettzeug weg; Haut trocken; roter Fleck, kam und verschwand am Bauch und Nacken; Bauch voll aber nicht hart; Stuhl war schmerzhaft gewesen, jetzt schmerzlos, lehmfarben, dünn, reichlich, häufig; hatte zehn Tage lang alles sogleich erbrochen, aber ist hungrig während der Brechübelkeit; Durst plötzlich und zeitweilig; Zunge trocken, dick belegt, weiß, Papillen stehen vor; Schleim im Munde und auf den Zähnen, klebrig, dunkel.
- Gelbfieber; gastrohepatischer Typ, mit dünner schwärzlicher oder gelblicher Diarrhoe; dünnes, schwärzliches oder gelbliches Erbrechen von Galle oder Blut; Brennen im Magen; Lippen und Zunge trocken, braun und aufgesprungen; kalter Schweiß an der Stirn; große Erschöpfung und kleiner aussetzender Puls; Gesicht gelblich, bläulich, kalt, schweißbedeckt; Augen trübe, gelb, wäßrig; Taubheit; Schluckbeschwerden; Schluckauf; Durst; kalte Hände und Füße; Zittern; Krämpfe; Koma; Bewußtlosigkeit, Delirium; Schwindel; furchtsam, niedergeschlagen, unruhig.
- 41 **Anfälle, Periodizität.** Intermittierend: Stirnneuralgie; Neuralgie der Därme. Allmählich: Schmerz ausstrahlend vom Oberbauch zu Seiten und Rücken.

- Alle paar Minuten: Neuralgie in den Därmen.  
 Alle fünfzehn Minuten: Erbrechen.
- 5 Zwei Stunden lang: Erbrechen und Diarrhoe bei Cholera.  
 Acht Stunden lang: Frostschauer.  
 Jeden Morgen 4 oder 5 Uhr morgens: Schmerzen in den Armen; Hüftschmerz.  
 Jeden Tag: Frostschauer.  
 Jeden zweiten Tag: remittierendes Fieber; Frostschauer.
- 10 Drei Tage lang: unaufhörlicher Schlaf.  
 Zwei Wochen lang: Schmerz in der Unterbauchgegend.  
 Drei Wochen lang: Diarrhoe.  
 Sechs Monate lang: schmerzlose Diarrhoe.  
 Zehn Monate lang: Erschöpfung mit Diarrhoe.
- 15 Fast zwei Jahre lang: Erbrechen nach den Mahlzeiten.  
 Seit einigen Jahren: morgens Diarrhoe.  
 10 Jahre lang: Muskelschmerzen.  
 Herbst und Frühling: Keuchhustenedidemie; Neuralgie in den Armen.
- 42 **Ort und Richtung.** Links: Kopf fällt beim Heben herab; Gesichtsneuralgie, Auge blutüberfüllt (injiziert); Funken vor dem Auge; Neuralgie in den Därmen <; brennender Schmerz unter den Rippen; starker Schmerz im Hypochondrium; Schmerz in der Brust; Schmerz im Unterarm; Reißen im Bein.  
 Rechts: als ob ein Haarbüschel elektrisiert sei; Neuralgie des Lides; Nasenbluten; Gesichtsneuralgie; Hypochondrium gespannt, empfindlich gegen Druck; Schocks in der Hüfte; schmerzendes Stechen in den Zehen.  
 Von links nach rechts: Gesichtsneuralgie.
- 43 **Empfindungen.** Als sei sie schwanger oder in Geburtswehen; als habe er ein schlechtes Gewissen oder habe ein Verbrechen begangen; als ob Gegenstände im Kreise wirbeln würden; wie von einem Eisklumpen auf dem Scheitel; als würde das Gehirn in Stücke gerissen; als würde der Kopf zerspringen; wie von Hitze und Kälte zur gleichen Zeit an der Kopfhaut; als ob ein Haarbüschel elektrisiert sei; Augenlider wie wund gerieben; als ob Salz zwischen Oberlid und Augapfel sei; als ob die Innenfläche der Lider zu trocken sei; als ob Hunderte feiner Nadelspitzen in die Augenlider stechen würden; als seien die Ohren verstopft; als ob die Nase trocken sei; Zähne fühlen sich wie angefüllt mit Blei; als ob die Zunge zu schwer sei; Kälte, wie von Pfefferminz im Munde; wie von Staub im Halse; als ob der Mund von Schleim umgeben sei; als ob etwas Lebendiges vom Magen in den Hals aufsteigen würde; wie von Heißhunger, Schmerz im Magen; vom Bauch austrahlender Schmerz; quälende Beschwerden in Herz und Oberbauch; flaves und leeres Gefühl im Bauch; als würden Messer in den Därmen schneiden; wie von heißen Kohlen im Bauch; Kneifen wie mit einer Zange im Bauch; als ob die Därme verknotet seien; als ob kaltes Wasser durch die

Venen lüefe; Arme wie zerschlagen oder gebrochen; als ob die Knochen des li. Unterarmes gedrüekt würden; als ob die Arme zu voll und geschwollen seien, fühlen sich kalt an beim Heben derselben; als ob die Hände eingeschlafen gewesen seien; als sei ein schwerer Stein an den Füßen und Knien festgebunden; die Glieder schmerzen wie erschöpft von sehr großer Müdigkeit; als müsse sie wegfliegen.

Schmerz: unter den Schulterblättern; in der Lebergegend; in den Schultern; in den Schienbeinen, wie zerbrochen.

Brennen: im Gehirn; in Mund und Hals; in der Magengrube; in Magen und Speiseröhre; im Bauch; unter den li. Rippen; der Kolik; im After; im Rektum.

Druck: im Gehirn; auf dem Scheitel; in den Augen; in der Magengrube; in der Lebergegend; in Gegend des Brustbeines; in den Knochen des li. Unterarmes.

5 Gefühl wie zerschlagen: im Gehirn; in der Kreuzbeingegend.

Heftiger Schmerz: in der Hüfte, 4 Uhr morgens.

Intensiver Schmerz: in den Armen, weckt aus dem Schlafe, um 4 Uhr oder 5 Uhr morgens.

Kneifen: der Kolik.

Kneifen: im Bauch, über und unter dem Nabel.

10 Krampfartiger Schmerz: im Oberbauch.

Krämpfe: in den Waden, Füßen und Fingern; in den Därmen; in den Kaumuskeln; in den Oberschenkeln.

Neuralgischer Schmerz: im Kopf, im Gesicht; in den Därmen; im Plexus brachialis.

Pochen: des Kopfschmerzes; des Zahnschmerzes; in der re. Schläfe.

Reißen: in den Augen; im Gesicht; in den Wangen, Schläfen und Augen; in den Beinen; im li. Bein vom Oberschenkel zu den Zehen.

15 Rheumatische Schmerzen: zwischen den Schulterblättern; in den Gliedern.

Scharfer Schmerz: in der Unterbauchgend.

Schmerzen (Wehtun): in den Därmen.

Schmerzendes Stechen: in den Zehen des re. Fußes.

Schmerzhaftigkeit (wie wund°): des Kopfes; der Augenlider, wie wund gerieben.

20 Schneiden: im Bauch; der Kolik; im Magen; in der li. Brustseite<sup>RA173-</sup>.

Starker Schmerz: im Magen, eine Stunde nach dem Essen; im li. Hypochondrium; im absteigenden Dickdarm.

Stechen wie Nadelstiche: in Fingern und Zehen vor der Bewußtlosigkeit.

Stiche: in der Unterkieferdrüse; an der Rückwand der Gebärmutter; an den Seiten der Brust; in den Hühneraugen<sup>RA(288)+</sup>.

Verdrehend: Kolik.

25 Ziehen: im Gesicht; in den Fingern.

- Auftreibung: im Rachen; in der Magengrube.  
 Ersticken (wie): beim Erbrechen.  
 Erstickendes Würgen: beim Schlucken.  
 Flauheit: im Bauch; während oder nach den Stühlen.
- 30 Kitzeln: in der Luftröhre; in den Bronchien, in den untersten Ästen; im Halse.  
 Kratzen: im Halse.  
 Kribbeln: in den Gliedern; in den Fingern; in den Händen; am ganzen Körper.  
 Ohnmacht: mit Übelkeit.  
 Rauheit: im Halse.
- 35 Schwäche: im Magen; Unterbauch.  
 Schwere: des Kopfes; der Augenlider; in den Zähnen; in der Zunge.  
 Spannung: im Bauch.  
 Steifheit: des Nackens; der Augenlider; der Kaumuskeln.  
 Trockenheit: der Augenlider; des Mundes und Gaumens; im Halse; des Rachens.
- 40 Völle: im Magen und den Därmen.  
 Zittern: im Magen.  
 Zusammenschnüren: des Halses; in den Därmen; in der Brust; des Kehlkopfes.  
 Kribbeln (Krabbeln): in den Händen.  
 Wärme: in den Fingern und Zehen, vor Bewußtlosigkeit.
- 45 Hitze: in den Augen; im After; am ganzen Körper.  
 Frösteln: läuft vom Kopf zu den Füßen.  
 Kälte: im Munde; im Halse; im Magen; im Bauch.
- 44 **Gewebe.** Schnelles Sinken der Lebenskraft; Kollaps.  
 Ganzer Körper und Gesicht blaß; kalter Schweiß.  
 Haut und Muskeln schlaff.  
 Blutvergiftung.
- 5 Anasarka (Hautwassersucht); Erbrechen, Stuhlentleerung, große Erschöpfung.  
 Krämpfe in den Gliedern.
- 45 **Berührung. Passive Bewegung. Verletzungen.** Berührung: Bauch schmerzhaft.  
 Druck: geringster, Neuralgie des Lides <; li. Hypochondrium empfindlich.  
 Leichte Wunden: verursachen Ohnmacht.  
 † Unfallschock.
- 46 **Haut.** † Haut blau, purpurrot, kalt; runzlig; verbleibt in Falten, wenn gekniffen.  
 † Haut fahl, kalt; Puls fadenförmig; schläfrig und unruhig.  
 Frieselausschlag am ganzen Körper, oder an Gesicht und Händen.  
 Trockene Ausschläge wie Krätze.
- 5 Abschuppung verhärteter oder verdickter Teile der Haut.<sup>RA(294)</sup>  
 Wundrose (Erysipel).  
 Brennen nach Kratzen.  
 Hitze und Kribbeln am ganzen Körper.



Jucken und ätzendes Jucken.

10 Starke Stiche in den Hühneraugen im Sitzen.

! Haut anämisch oder zyanotisch.

! Masern verzögert und blaß; Haut fahl; Blutungen, aber keine Besserung; schläfrig; schwach; kalt; fadenförmiger Puls; krampfartiger Puls und Brechreiz.

! Scharlach in heißem Sommerwetter; Ausschlag bläulich; Puls schwach; brennende Hitze der Glieder im Wechsel mit Kälte.

Geschwüre bläulich, hart, verhärtet, juckend, schmerzlos, aber mit rotem Hof; Eiter spärlich.

47 **Alter und Konstitution.** Kinder und alte Leute.

Anämie.

Magere, choleriche oder schwermütige Personen.

Junge Leute und Frauen von sanguinischem oder nervös-sanguinischem Temperament; auch Leute, die für gewöhnlich kalt sind und die eine mangelhafte Reaktion aufweisen; fröhliche Veranlagung; veränderliche Stimmung.

5 Knabe, 6 Monate alt, in schlechtem Ernährungszustand, verdrießlich, leidet seit fünf Wochen an Keuchhusten; Stimmritzenkrampf.

Kind, 9 Monate alt; Stimmritzenkrampf.

Baby, 9 Monate alt; Brechdurchfall der Säuglinge (Cholera infantum).

Knabe, 11 Monate alt; Hirnhautentzündung.

Mädchen, 15 Monate alt; echte Cholera.

10 Knabe, 3 J. alt, leidet seit drei Wochen; Diarrhoe.

Mädchen, 5 J. alt; Cholera.

Knabe, 5 J. alt; Typhus<sup>†</sup>.

Knabe, 9 J. alt, nach Typhus<sup>†</sup>; Heißhunger (Bulimie).

Knabe, 9 J. alt; Erbrechen.

15 Mädchen, 11 J. alt, hat Wechselfieber gehabt; Neuralgie der Därme.

Knabe, 12 J. alt; Wechselfieber.

Knabe, 13 J. alt; Diarrhoe.

Mädchen, 15 J. alt, zart aussehend; Chorea.

Mädchen, 17 J. alt; Cholera.

20 Mädchen, 18 J. alt, kräftig, blaß, schlank; Gesichtsneuralgie.

Mädchen, 19 J. alt, krank seit einigen Jahren; Dysmenorrhoe und Hä-mophthalmus.

Jüdin, 20 J. alt, Rest der Familie ähnlich betroffen; Weichselzopf (Plica polonica).

Fräulein —, 20 J. alt; Diarrhoe.

Frau, 21 J. alt, krank seit drei Monaten; Magenschmerz.

25 Schriftsetzer, 24 J. alt, mager, blaß, erdfahle Gesichtsfarbe; Kolikschmerz.

Fräulein B., 26 J. alt; Geisteskrankheit.

Frau C., 26 J. alt, helle Gesichtsfarbe, sanft; Geisteskrankheit.

Mann, 29 J. alt; Wahnsinn.

- Frau, 30 J. alt, hat vor zwei Wochen entbunden; Geisteskrankheit.
- <sup>30</sup> Frau, 30 J. alt; geisteskrank.  
 Frau, 30 J. alt; Geisteskrankheit.  
 Frau, 30 J. alt, nervös; Gesichtsneuralgie.  
 Frau B., 30 J. alt; Leeregefühl im Bauch.  
 Mann, 30 J. alt; Wechselfieber.
- <sup>35</sup> Bauersfrau, 32 J. alt; Wahnsinn.  
 Mann, 32 J. alt, kräftig, leidet seit drei Jahren; Schmerzen in den Armen.  
 Fräulein —, 33 J. alt; Wahnsinn.  
 Frau, 34 J. alt, krank seit einer Woche; Dyspepsie.  
 Frau, 36 J. alt, seit acht Tagen krank; Geisteskrankheit.
- <sup>40</sup> Mann, 36 J. alt, zart, nach einem kalten Getränk sechs Monate zuvor; Diarrhoe.  
 Frau, 38 J. alt; Geisteskrankheit.  
 Frau, 40 J. alt; Erbrechen.  
 Frau, 40 J. alt, krank seit fünf Wochen; Dyspepsie.  
 Frau, 43 J. alt, leidet seit drei Jahren seit dem Aufhören der Menstruation;  
 Erbrechen.
- <sup>45</sup> Frau, 44 J. alt, krank seit sechs Monaten; Dyspepsie.  
 Frau, 47 J. alt, schwach, abgemagert; Kolik.  
 Mann, 50 J. alt, leidet an Rheumatismus und Hämorrhoiden; Erkrankung des  
 Halses.  
 Mann, 50 J. alt; Magenstörung.  
 Mann, 50 J. alt; echte Cholera.
- <sup>50</sup> Frau, 54 J. alt; Magenkrampf (Gastrodynie).  
 Frau, 55 J. alt, krank seit sechs Jahren; Dyspepsie.  
 Frau, 56 J. alt, mittelgroß, schwach, gichtisch; Kolik.  
 Mann, 60 J. alt, Müller; Geisteskrankheit.  
 Mann, 60 J. alt; Darmeinstülpung.
- <sup>55</sup> Frau, 60 J. alt, nach Schreck; Diarrhoe.  
 Kaufmann, 62 J. alt, kräftig, wohlgenährt, führt ein Leben voller Aufregung  
 und Sorge; Heißhunger (Bulimie).  
 Fräulein F., krank seit zehn Monaten; Diarrhoe.  
 Alte Dame, klein, dünn, schwach, ist schwerhörig und hat einen Sprachfehler;  
 Ischias.
- <sup>48</sup> **Verwandtschaften.** Wird antidotiert von: *Acon.*, *Camphora*, *China*, *Coffea*.  
 Es antidotiert (ist Gegenmittel): *Arsen.*, *China*, *Cuprum* (Kolik), *Ferrum*,  
*Opium*, und beseitigt schlechte Folgen von Alkohol und Tabak.  
 Verträglich mit: *Arsen.*, *Arnic.*, *China*, *Cuprum*, *Ipec*.